This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

E.2

Library

Arnold Arboretum

of

Harvard University

БОТАНИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ и САДЪ
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университетѣ.

СПИСОКЪ

ОРАНЖЕРЕЙНЫХЪ РАСТЕНІЙ

БОТАНИЧЕСКАГО САДА

при

ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ

за 1901 годъ,

составилъ Р. Ф. Ниманъ.
Ученый Садовникъ при СПб. Университетѣ.

Verzeichniss der im Botan. Garten der Kaiserl. Universität St. Petersburg kultivirten Gewächshauspflanzen.
von Paul Niemann

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія „Герольда" (Вознесенскій пр. 3).
1901.

1930

БОТАНИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ и САДЪ
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университетѣ.

СПИСОКЪ
Spisok
ОРАНЖЕРЕЙНЫХЪ РАСТЕНІЙ
oranzhereĭnykh rasteniĭ
БОТАНИЧЕСКАГО САДА
Botanicheskago Sada
при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ
Imperatorskom ... burgskom Universi...
за 1901 годъ,
za ...
R. F. Niman
составилъ **Р. Ф. Ниманъ.**
Ученый Садовникъ при СПб. Университетѣ.

... plant...

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія „Герольда" (Вознесенскій пр. 3).
1901.

40941
Aug 2, 1933

Cer
Sa 2.2

BPB 2660
VW 7001

Печатано по распоряженію С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей.

A. Phanerogamae.

I. Dicotyledones.

1. Acanthaceae.

dhatoda vasica Nees. Nepaulia.
phelandra Roezli Rgl. America austr.
eloperone plumbaginifolia Nees. Brasilia.
yrtanthera Pohliana Nees. var discolor. Brasilia.
— — var. velutina. Brasilia.
ranthemum Beyrichi hort. Brasilia.
— Eldorado pl. hybr.
— leuconeuron Fisch. Brasilia.
— marmoratum hort. Brasilia.
ttonia argyroneura E. Coem. Peruvia.
— gigantea Lind. Peruvia. E. Coem.
— Verschaffelti E. Coem. Pern.
— — var. Pearcei hort. Brasilia.
ldfussia anisophylla Nees. [= Strobilanthes anisophyllus] India orient.
ellia Devosiana hort. Makoy. Brasilia.
— macrantha Mart. Brasilia.
— maculata Wall. [=Strobilanthes maculata Nees] Himalaya.
phanophysum pulchellum Schott. [=Stephanoph. rubicaulis Cav.]. Mexico.
robilanthes Dyerianus hort. Lemoin.
unbergia alata Hook. Insula Zanzibar.
— coccinea Wall. Himalaya; Burma.
— fragrans Roxb. India or. et occ.

2. Acerineae.

Acer pictum Thunb. Mandshuria.
— Sieboldianum Thunb. Japonia.

3. Amarantaceae.

Achyranthes Verschaffelti Lem. [=Iresine Herbsti Hook.] Brasilia.
Alternanthera amabilis hort. America austr.
— amoena hort. America austr.
— Kunzii hort.
— multicolor hort, [=Telanthera ficoides] America austr.
— paranychioides St. Hil. America austr.
— paronychioides St. Hill. v. aurea hort.
— van Houttei hort.
— versicolor. hort. [=Telanthera versicolor Rgl.) America austr.
Deeringia baccata Mog. [=Deeringia celosioides R. Br.] Asia et Austral. tropica.
— — var. foliis var.
Iresine Lindeni Van Houtte. hab.?
— Wallisii Ortg. Nova Granada.

4. Ampelideae.

Cissus antarctica Vent. [= Vitis antarctica Benth.] Australia.

Cissus discolor Bl. Java.
Vitis radicantissimus
— serjanaefolia Max. Japonia.
— Veitchii Lynch. Japonia.
— vinifera L. Europa austr., Oriens.

5. Anacardiaceae.

Pistacia vera L. Regio Mediterr. Oriens.
Rhus Cotinus L. Reg. Med., Oriens, Himalay., China.
— succedana L. var. japonica Engl. Japonia.
— sylvestris Sieb. et Zucc. Japonia.
— typhina L. America bor.
Schinus terebinthifolius Raddi. Brasilia.
Spondias Solandri Benth. [=Pleiogynium Solandri Engl.]. Australia.

6. Anonaceae.

Anona laevis H. B. Kth. Guiana, Venezuela.
— muricata L. America tropica.
— squamosa L. America tropica.
Eupomatia laurina R. Br. Nova Hollandia.
Unona sp. e Brasil.

7. Apocyneae.

Allamanda Chelsoni America tropica.
— neriifolia Hook. Brasilia.
— nobilis Th. Moore Brasilia.
Echites melaleuca hort.
Nerium Oleander L. Regio Mediterranea, Oriens.
— — var. fl. pleno.
Strophanthus scandens Griff. Malacca.
— Kalimandzaro India orient.
Tabernämontana Camassa Booth. India orientalis.
Vinca major L. Europa australis.

8. Araliaceae.

Cussonia thyrsiflora Thunb. Africa austr.
Didymopanax calophyllum Dcne. B
silia.
Fatsia japonica Dcne. et Bl. [= A
lia japonica Thunb.] Japonia
— — var. fol. var.
Gastonia palmata Roxb. [=Treve
palmata Dcne.] Insul. Molucc
Hedera Helix L. Europa, Asia ten
Africa bor.
— Helix var. typica.
— — var. fol. var.
— — var. colchica Koch. Ca
casus.
Panax crassifolium Dcne. et Plan
[=Pseudopanax crassifolium
Koch.]
— Rumphii? Nova Zealandia.
Trevesia sundaica Miq. Java.

9. Aristolochieae.

Aristolochia fimbriata Cham. Brasili
— gigas Lindl. [=A. grandifl
Arr.]. Pernamb.
— ornithocephala Hook. [=Arist
brasiliensis Mart. et Zucc.]. B
silia.

10. Asclepiadeae.

Asclepias tuberosa L. America bor.
Ceropegia Sandersonii Dcne. Natal.
Cryptolepis longiflora Rgl. India orie
Hoya carnosa R. Br. Asia tropica
America tropica.
— mollis.
Schubertia grandiflora Mart. Brasil
Stapelia atropurpurea S. D. Afr. aus
— anguinea Jacq. [= St. pi
Donn.]
— atrata Tod. Africa austr.
— bufoniae Jacq. [=St. variega
L.] Afr. austr.
— fuscata Jacq. Africa australis.
— Hanburyana Brgl. Rust.
— marmorata Jacq. Africa austr.
— rugosa Jacq. Africa austr.
— sororia Mass. Africa austr.

Stapelia umbellata Donn. [=Boucerosia umbellata Wight. et Arn.] India orient.

11. Begoniaceae.

Begonia albo-picta pl. hybr.
— argenteo-guttata.
— Bismarckii hort. pl. hybr.
— Diadema Lindl. Borneo.
— imperialis Lem. var. splendens Mexico.
— Leopoldi pl. hybr.
— Mad. Louise d'or.
— metallica J. Sm. America trop.
— Olbia O. de Kerch. Brasilia.
— panosa h. Berol Brasilia.
— President de Boeureuill pl. hybr.
— Rex. Putzs. Ind. orient.
— ricinifolia A. Dietr. Brasilia.
— Rudolf v. Habsburg pl. hybr.
— Schmidtiana Rgl. Brasilia.
— semperflorens Lk. et Otto. Brasilia.
— tuberosa Lam. var. divers. Ins. Moluccae.
— undulata Schott. Brasilia.
— versicolor pl. hybr.

12. Berberideae.

Berberis canadensis Pursh. Amer. septentr.
— Fortunei Lindl. China bor.
— integerrima Bnge. Caucasus, Turkestan.
— nitens hort. [=Berberis canadensis Pursh.?].
— sinensis Desf. China.
— Thunbergi D. C. Japonia.
— vulgaris L. Europa. Oriens.
— — var. fol. atropurpur.

Epimedium macranthum Moore & Dcne. Japonia.
— macranthum f. niveum.
— — f. roseum.
— — f. sulphureum.
— — f. violaceum.

Nandina domestica Thunb. China, Japonia.

13. Bignoniaceae.

Bignonia Catalpa L. [=Catalpa bignonioides Walt.] America bor.
— Chica Humb. Bonpl. Venezuela.
— Mackenzi.
— Thunbergii.

Colea floribunda Boj. Madagascar.

Crescentia Cujete L. America trop.
— macrophylla Seem. [=A mphitecna macrophylla Miers] America centr.

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav. [=Calampelis scabra Don.] Chili.

Jacaranda mimosaefolia D. Don. [=Jacaranda ovalifolia R. Br.] America austr.

14. Bixineae.

Bixa orellana L. Amer. austr.

15. Borragineae.

Heliotropium peruvianum L. Peru.

16. Cacteae.

Astrophytum myriostigma Lem. [=Echinocactus myriostigma S.-Dyck.] Mexico.

Cereus alacriportanus hort. Monac. Brasilia.
— Bonplandii Parm. Brasilia.
— flabelliformis Mill. America austr.
— Forbesii S.-Dyck.
— grandiflorus Mill. India occid.
— hybridus flor. ros.
— Jamacaru D. C. Brasilia.
— mamillatus Englm.
— Martiana Zucc. Mexico.
— peruvianus Mill. America austr.
— — var. montrosa.
— Schottii Englm. var. australis.
— spec.
— tortuosus Forbes. Regio Argent.
— validus. Haw. America austr.

Echinocactus cylindraceus Engelm. California.

Echinocactus Grusoni Hild.
— lamprochlorus.
— lephothele S.-Dyck. Mexico.
— Maximilianus.
— viridescens Nutt. California.
Echinocereus cinerascens Lem. Mexico.
— Engelmanni Lem. California.
Echinopsis minuscula Web.
— multiplex Pf. Otto v. roseocristata. Brasilia.
— oxygona Pfeif. et Otto. [= Cer. oxygona Otto]. Brasilia.
— Rholandi var. speciosa.
— Salmianus L. et Otto. Ins. Caracas.
— turbinata Pfeiff. et Otto [= Cercus turbinatus Pfeiff.] hab.?
— Zuccarini Pfeiff. Mexico.
Epiphyllum Altensteini Pfr. Brasilia
— — var. miniata. Brasilia.
— truncatum Pfr. Brasilia.
— — var. multiflorum hort.
— — var. spectabile hort.
— Russelianum Hook. Brasilia.
Malacocarpus Courantii S.-Dyck. [=Echinocactus Courantii Lem.] Brasilia.
Mamillaria applanata Engel. [= Mam. Heyderi Muhl]. Mexico.
— Celsiana Lem. Mexico.
— centricirrha Lem. Mexico.
— cirrhifera Mart. Mexico.
— dioica Brand.
— divaricata A. Diets. Mexico.
— dealbata Dietr. Mexico.
— echinata DC. Mexico.
— elegans DC. Mexico.
— eriacantha hort. Mexico.
— falcata Foerst. Mexico.
— Foersterii Muehlenpf. Mexico.
— fuscata Lk. et Otto. Mexico.
— Galeotti Scheidw. Mexico.
— gladiata Mart. Mexico.
— glochidiata Mart. Mexico.
— ilicifolia.
— magnimamma Zucc. Mexico.
— missouriensis Sweet. Amer. bor. occid.
Mamillaria multiceps S.-Dyck. Mexic
— Neumanniana Lem. Mexico.
— Nuttallii Engelm. America bo occid.
— polyedra Mart. Mexico.
— pulchella Lk. et Otto var. nigre cens America austr.
— pusilla Sweet America.
— rhodacantha S. D.
— Roseana Brand.
— rutila Zucc. Mexico.
— sanguinea Hooge. Mexico.
— uberiformis Zucc. Mexico.
— venusta Brand.
— viridis Salm. Mexico.
— vivipara Haw. var. neomexican N. Mexico.
— Zoesteri.
Opuntia argentina Griseb. Reg. Argen
— basilaris Engel. et Bigel. Americ
— brasiliensis Haw. Brasilia.
— comanchica Engel. Amer. bo occid.
— crassa Haw. Mexico.
— cymochila Engelm. Amer. bo occid.
— diademata Lem. Regio. Arge
— glaucophylla Wendl. Mexico.
— Ficus-indica Mill. America. aus
— leucotricha DC. Mexico.
— Labouretiana.
— monacantha Haw. America au tral.
— orbiculata Salm. Dyck. Chili.
— Piccolominiana Parl. Ameri austr.
— Rafinesquii Engelm. v. arka sana. Arkansas.
— spirocentra Engelm. N. Mexi
— tomentosa Salm. Dyck. Amer austr.
— Tuna Mill. Amer. austr.
— virens.
Pereskia aculeata Mill. [= Peires Peireskia Karst.]. India occid
— subulata Mühlenpf. Chili.
Phyllocactus Boothii.
— Conways giant.

Phillocactus specillimus.
Pilocereus giganteus Lem. Texas.
— Hoppenstedtii [= Pil. lateralis Web.].
— senilis Lem. Mexico.
— sublanatus Foerst. [= Cereus sublanatus Salm.].
Rhipsalis salicornioides Haw. Brasilia.
— pachyptera Pfeiff. Ind. occid.

17. Candolleaceae.

Candollea adnata F. Müll. [=Stylidium adnatum R. Br.] Australia.

18. Capparideae.

Capparis flexuosa Blum. Java.

19. Caprifoliaceae.

Lonicera brachypoda DC. var. fol. aureo-reticul. [= Lonicera-japonica Thunbg.] Regio Himalay.
— chrysantha Turcz. Davuria, Amur.
— gibbosa Willd. Mexico.
— iberica M. Bieb. Regio Caucas.
— Maximowiczii Maxim. [=Xylosteum Maximowiczii Rupr.] Amur.
— Morrowi A. Gr. [= Lonicera chrysantha Turcz. var.] Japonia borealis.
— tangutica Maxim. China.
Sambucus racemosa L. fol. var. Europa med. et australis.
Viburnum odoratissimum Ker - Gawl. China, Reg. Himalay.
— Tinus L. Europa australis.
— — var. fol. var. Europa austr.
— rugosum Pers. [=Vib. rigidum Vent.]. Ins. Canar.
Weigela rosea Lindl. [=Diervilla florida Sieb. & Zucc]. China.

20. Casuarineae.

Casuarina quadrivalvis Labill. [=Casuar. stricta Ait.]. Australia.
— tenuissima Sieb. [=Casuar. torulosa Ait.]. Australia.

21. Celastrineae.

Celastrus ruber Haw. Africa australis.
Elaeodendron chabrieri.
Evonymus japonica Thunb. Japonia.
— — var. fol. var. Japonia.
— — var. fastigiata Japonia.
— — var. radicans. Japonia.
— — var. tricolor. Japonia.
— — var. versicolor. Japonia.

22. Ceratophylleae.

Ceratophyllum demersum. L. Regio temp. et trop.

23. Chenopodiaceae.

Boussingaultia basselloides H.B. et Kth. Ecuador.

24. Chloranthaceae.

Chloranthus inconspicuus Sw. China, Japonia.

25. Combretaceae.

Combretum coccineum DC. India orient.

26. Compositae.

Aster ericoides L. America bor.
— hybridus hort. var. Feuerball hort. pl. hybr.
— pyramidalis h. Mann.
— roseus Desfont. [=Aster Novae Angliae L.] America bor.
Brachyglottis repanda Forst. Nova Zelandia.
Chrysanthemum frutescens L. [=Anthemis frutescens hort. = Pyrethrum frutescens Willd.]. Ins. Canariens.
Cineraria maritima L. var. candidissima [= Senecio Cineraria DC.] Reg. Mediter.
Dahlia variabilis Desf. [= Georgina variabilis Willd.]. Mexico.

Dahlia variabilis var. grandiflora.
— № 2. Anna Stesse.
— 3. Aurantia pyramidalis.
— 9. Edler Mohr.
— 17. Princess Mathilde
— 19. Violet King.
— 20. Dr. Klettke.
— 21. Montblanc.
— 23. Eleganteere.

Var. Castus — Dahlia.
№ 120a Duke of Clarence.
122. Genep. Gordon.
149. Sir Henry Patrik.
700. Gloriosa.
705. Harmony.
706. Earl of Pembroke.
717. F. Humpries.
721. Canellis Gem.
728. Fusilier.
729. J. E. Frewer.
730. Keynes White.
732. Miss Webster.
733. Mrs. Gordon Sloane.
734. Mrs. Wilson Noble.
737. Robold.
738. Hedwig.
739. Hiede.

Var. div.
Harlequin.
Lucretia.
Otto Licht.
President Carnot.
Rhoden.
Rosalinde.
Dr. Hechteritz.
White Queen.

Eupatorium micranthum Less. Mexico.
Georgina variabilis Willd. Mexico. [vidi, Dahlia-variabilis].
Gnaphalium undulatifolium L. Africa australis.
Helichrysum angustifolium DC. Regio Mediterr. or.
Kleinia ficoides Haw. [=Senecio ficoides DC.] Africa australis.
— neriifolia Haw. [=Senecio Kleinia Less.] Insula Canariensis.
Kleinia tomentosa Haw. [= Cacalia canescens Willd.] Africa australis
Senecio cruenta DC. [=Cineraria hybrida hort.] Ins. Canariens.

27. Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb. Japonia.
— — var. fol. var. Japonia.
— — var. fol. aureo-var. Japonia.
— — var. div. hort. Japonia.
Cornus Mas L. Europa, Asia minor.
Griselinia littoralis. Raoul. Nova Zelandia.

28. Crassulaceae.

Crassula lactea Ait. Africa austr.
— spathulata Thunb. Africa australis.
Cotyledon Desmetiana Hemsl. Mexico.
— spinosa L. [=Umbilicus spinosus DC.] Asia bor.
Echeveria metallica hort. [= Cotyledon gibbiflora Moc.]. Mexico.
— ovata Dêleuil. pl. hyb.
— Scheideckeri D. Smet.
Kalanchoë grandiflora A. Rich. var marmorata Hemsl. Africa trop.
— Welwitschii Britten. Africa trop.
Rochea falcata DC. Africa australis.
— spec.?
Sedum purpurascens Koch. Europa, Asia bor.
— sarmentosum Bnge. [= Sed. carneum var.] China.
— Sieboldii Sweet. Japonia.
Sempervivum arboreum L. Regio Mediterr.
— tabulaeforme Haw. Ins. Mader.
— Youngianum W. & B. Ins. Canar.
Umbilicus spinosus DC. [= Cotyledon spinosa L.] Asia bor.

29. Cruciferae.

Iberis corifolia Sweet. Europa australis.
— semperflorens L. Europa austr.

30. Cupuliferae.

Fagus sylvatica L. Europa.
— — var. foliis atropurpureis. Europa.
Quercus sempervirens Mill. var. pyramidalis. Reg. Mediterr., Oriens.

31. Dilleniaceae.

Curatella Imperialis Lindl. America trop.

32. Droseraceae.

Dionaea muscipula L. Carolina.
Drosera binata Lobill. Nova Zealand.
— capensis L. Africa austr.
— intermedia Hayne. Europa.
— longifolia L. Europa, Amer. bor.
— rotundifolia L. Regio borealis.

33. Ebenaceae.

Euclea Pseudebennus E. Mey. Africa australis.
Royena lucida L. Africa australis.

34. Elaeagnaceae.

Elaeagnus ferruginea Rich. Asia trop.
— pungens Thunb. Japonia.
— — var. fol. late-marginatis Japonia.
— — var. fol. aureo-variegatis Japonia.
— umbellata Thunbg. Japon.

35. Ericaceae.

Andromeda calyculata L. [= Cassandra caliculata Don.] Europa bor.
— Mariana L. [= Pieris Mariana Brith. & Hook.]. America bor.
— polifolia L. Europa bor.
Azalea indica L. Himalay.
— — var. diversae hort.
Clethra arborea Ait. Ins. Madera.
Erica carnea L. Europa austr.
— ciliaris L. var. occidentalis. Europa austr. oecid.
— curviflora L. var. rubra. Africa australis.
— — var. hibernica [= Erica hibernica Syme]. Hibernia.
— cyathiformis Salisb. Africa austr.
— mediterranea L. Europa austr.
— pelviformis Salisb. Africa austr.
— persoluta L. var. caffra Kl. Africa austz.
— — L. var. laxa Bl. Africa austr.
— stricta Andr. v. vulgaris. Europa austr.
— — var. ramulosa Rgl. Europa austi.
— Tetralix L. var. canescens. Europa austr.
Rhododendron arboreum Sm. Nepaulia.
— dauricum L. Sibiria.
— formosum Hook. India orient.
— Jenkinsii Nutt. India orient.

36. Euphorbiaceae.

Acalypha musaica h. Veitch.
— obovata Benth. [=Acalypha cuneata Poepp.] America austr.
Antidesma Bunius Sprengl. Ind. or. Malaga.
Buxus balearica L. Ins. Balear.
— sempervirens L. Europa, Oriens.
— — var. fol. aureo-varieg.
Codiaeum variegatum Blume. [=Croton pictus L.C.variegatus L.] Malaga.
Dalechampsia Roezliana Müll. Arg. Mexico.
Euphorbia antiquorum L. India or.
— caput Medusae L. Africa austr.
— canariensis L. Insula Canariens.
— Fournieri Reb.
— grandicornis hort.
— splendens Boj. Madagascar.
— Rebuti.
Hevea brasiliensis Müll. arg. Brasilia.
Hura crepitans L. America austr.

Iatropha multifida L. Regio tropica.
Manihot carthaginensis Müll. arg. America tropica.
-- palmata Müll. arg. var. multifida. Müll. Brasilia.
Pachysandra terminalis Sieb et Zucc. Japonia.
Phyllanthus atropurpureus Boj. Insulae Comores.
— muricatus Wall. India orient.
Xylophylla arbuscula Willd. [=Phyllanthus speciosus Jacq. var.] India occid.
— speciosa Jacq. India occidentalis.

37. Ficoideae.

Mesembryanthemum barbatum L. Africa austral.
— blandum Haw. Africa austr.
— candens Haw. Africa austr.
— difforme L. Africa austr.
— edule L. Africa austr.
— filamentosum L. Africa austr.
— floribundum Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— Lehmanni Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— linguiforme L. Africa austr.
-- pustulatum Haw. Africa austr.
— splendens Eckl. & Zeyh. Africa austr.
— subincanum Haw. Africa austr.
— tigrinum Haw. Africa austr.

38. Fumariaceae.

Corydalis nobilis Pers. Sibiria.
— solida Sm. [= Cor. bulbosa DC.] Europa.
Dicentra spectabilis Lem. [=Diclytra spectab. DC.] Japonia.

39. Geraniaceae.

Biophytum sensitivum L. Cosmop. tropica.
Pelargonium peltatum Ait. Africa austr.
-- quinquelobum Colla. var. rosodorum hort. Africa austr.
— zonale L'Herit. var. Fürst Bismarck hort.
— — var. Distinction. hort.
— — var. Happythougt. hort.
-- -- var. Mad. Salleray hort.
-- -- var. Mrs. Parker hort.

40. Gesneraceae.

Achimenes grandiflora DC. Mexico.
— — var. div. hort.
Cyrtodeira fulgida Lind. [=Episcia fulgida Hook. fil.] Nov. Granat.
Gloxinia speciosa Ker. Brasilia.
— — var. div. hort.
Saintpaulia ionantha Wendl. Montes Usambara Africae orient.
Sciadocalyx Lindeniana Rgl. America tropica.
Sinningia hybrida hort.
— sanguinea Rgl. Brasilia.
Tydaea hybrida Rgl. var. grandiflora. gloxiniaeflora America austr.

41. Haloragaeae.

Gunnera scabra Ruiz & Pav. Chile.
Myriophyllum proserpinacoides Gill. [= Myrioph. japonicum. hort. = Herpestes reflexa hort.]. America austr.

42. Hypericineae.

Hypericum Androsaemum L. Europa.

43. Ilicineae.

Ilex aequifolium L. Europa.
— — var. fol. var. Europa.
— cornuta Ldl. China.
— spec. [Annam.].
— vomitoria Ait. Carolina, Florida.

44. Labiatae.

Coleus scutellarioides Benth. [=Coleus hybridus hort.]. India or. Australia.
— — var. atropurpurea Benth.
— — var. Blumei Benth.
— — var. Verschaffeltii Lem.
Plectranthus fruticosus L'Herit. Africa aust.
Pogostemon Patchouli Pellet. India or., Burma.
Rosmarinus officinalis L. Regio Medit.
Salvia officinalis L. Europa austr.
Scutellaria costaricana Wendl. America centralis.
— splendens Lk. Kl. et Otto. Mexico.
Teucrium fruticans L. Regio Mediter. occident.
Westringia rosmariniformis Sm. Nova Hollandia.

45. Laurineae.

Cinnamomum Culilawan Bl. Malaga, China.
— dulce Nees. China.
— Reinwardtii Nees. Java, Regio Himalay.
— sericeum Sieb. [= Laurus sericea]. Java.
— zeylanicum Nees. India orient. Malaga.
Cryptocarya triplinervis R. Br. [=Caryodaphne Browniana Nees. Australia.
Laurus Camphora L. [= Camphora officinarum Nees. =Cinnamomum Camphora Fr. N.]. China, Japonia.
— nobilis L. Europa austr. Oriens.
— — var. augustifolia hort. Europa australis, Oriens.
— sericea Bl. [=Cinnamomum sericeum Sieb.] Java.
Litsea glauca Nees. India orient.
Oreodaphne foetens Nees. [= Ocotea foetens Benth. et Hook.] Insul Canariens.
— regalis Rgl. America centralis.
Tetranthera laurifolia Jacq. [= Sebifera glutinosa Lour.] Cochinchina.

46. Leguminosae.

Abrus precatorius L. Regio tropica.
Acacia armata R. Br. Australia.
— cornigera Willd. Mexico.
— cultriformis A. Cunn. Australia.
— Cyclops. A. Cunn. Australia.
— dealbata Lk. Australia.
— dolabriformis. A. Cunn. Australia.
— holosericea A. Cunn. Australia.
— iteaphylla F. Müll. Australia.
— longifolia Willd. Australia.
— Melanoxylon R. Br. Australia.
— salicina Lindl. Australia.
— verticillata Willd. Australia.
Albizzia Lophantha Benth. [= Acacia Lophantha Willd.] Australia.
— pruinosa F. Müll. [=Pithecolobium pruinosum Benth.] Australia.
Amicia Zygomeris DC. Mexico.
Bauhinia candicans Benth. Brasilia.
— purpurea L. India orient., Burma, China.
Caesalpinia echinata Lam. Brasilia.
— tinctoria H. B. Kth. [= Coulteria chinensis DC.] Chili.
Caragana frutescens L. Caucasus, Songoria.
— microphylla Lam. Sibiria altaica.
— Redowski DC. Sibiria.
Carmichaelia australis R. Br. Nova Zelandia.
— spec.
Centrosema brasilianum Benth. Brasilia.
Ceratonia siliqua L. Europa austr., Oriens.

Cytisus albus Lk. var. Regio Medit. occ.
— Laburnum L. Europa austr.
— purpureus Scop. Austria austr. Italia.
— ramosissimus Poir. [= Cytisus canariensis Steudl.] Ins. Canar.
— var. superbus.
— uralensis hort. [= Cytisus capitatus Scop. var.] Europa austr.
Desmodium gyrans DC. [= Hedysarum gyrans L. fil.] Asia tropica.
Edwardsia grandiflora Salisb. [=Sophora tetraptera J. Mill.] Nova Zeland. Chili.
— Macnabiana R. Grah. [= Sophora tetraptera]. Nov. Zeland. Chili.
Erythrina bogotensis America austr.
— crista-galli L. Brasilia.
Genista bracteolata Lk. [=Gen. stylosa G. Don.] Lusitania.
— canariensis DC. [=Cytisus canariensis Steudl.] Ins. Canariens.
— florida L. Regio Mediterranea.
— mantica Poll. Italia.
— ovata Waldst. & Kit. Europa or.
— polygalifolia DC. Lusitania.
— rhodopnoa Webb. & Bert. [=Cytisus canariensis Steudl. var.] Ins. Canariens.
— sibirica Gilib. Sibiria.
— thyrsiflora hort. [=Gen. tinctoria L. var.] Europa. Caucas., Oriens.
— tinctoria L. Europa, Caucasus, Oriens.
Glycine multijuga Clem. [= Wistaria chinensis DC.] China.
Haematoxylon Campechianum L. America tropica.
Hedysarum gyrans L. fil. [= Desmodium gyrans DC.] Asia trop.
Hymenaea Courbaril L. America austr.
Kennedya monophylla Vent. [= Hardenbergia monophylla Bnth.] Australia.
— prostrata Ait. Australia.
Lathyrus Mulkak. Lipsky. Turkestania.
Machaerium firmum Benth. Brasilia.
Mimosa pudica L. Brasilia.
sensitiva L. Amer. trop.
— Spegazzinii Pirotta. America austr.
Parkinsonia aculeata L. America tropica.
Platylobium pruinosum Benth. Austral.
Pueraria Thunbergiana Benth. China, Japonia.
Robinia Pseud-acacia L. America septentr.
Ulex europaeus L. Europa occid.

47. Lineae.

Erythroxylon Coca Lam. Peru.

48. Lobeliaceae.

Lobelia bicolor Sims. [=Lobelia Erinus L. var.] Africa australis.
— fulgens Willd. Mexico.
— syphilitica L. Africa austr.

49. Magnoliaceae.

Drimys Winteri Forst. [=Drimys chilensis DC.] America austr.
Illicium anisatum L. China.
Liriodendron tulipifera L. America bor.
Magnolia fuscata Andr. [=Michelia fuscata Bl.] China.
— grandiflora L. America septentr.
— pumila Andr. China, Java.
— Yulan Desf. China.

50. Malpighiaceae.

Malpighia ilicifolia Mill. [= Malpighia aquifolia L.]. America austr.
— urens L. India occid.

51. Malvaceae.

Abutilon atrosanguineum pl. hybr.
— Darwini Hook. fil. Brasilia.

Abutilon floribundum Schlecht. Mexico.
— hybridum Rgl. var. Souvenir de Bonn. America austr.
— megapotamicum St. Hil. var. fol. var. America tropica.
Goethea cauliflora Nees. Brasilia.
Gossypium herbaceum L. Asia tropica.
— vitifolium Lam. Regio trop.
Hibiscus Cooperi hort. [=Hibisc. Rosa sinensis L. var]. Geront. tropica.
— Rosa-sinensis L. Geront. tropica
— — var. brillantissima.
— — var. chrysantha.
— schizopetalus Hook. fil. Africa tropica.
— syriacus L. Geront. Calidar.
Pavonia Wioti E. Mor. [=Pavonia multiflora St. Hil.]. Brasilia.

52. Melastomaceae.

Amphiblemma cymosum Naud. Africa. bor.
Bertolonia guttata Hook. var. van Houttei hort. Ins. Madag.
— vittata hort.
Centradenia floribunda Planch. Mexico.
— grandiflora Endl. Mexico.
Miconia speciosa Naud. [=Cyanophyllum speciosum hort.] Brasilia.
Medinilla farinosa Rgl. [=Medinila venosa Bl.] Malaya.
Sonerila margaritacea Lindl. India orientalis.
— Leopold II pl. hyb.

53. Meliaceae.

Cedrela odorata L. Asia tropica.
Melia Azedarach L. Ind. orient. Regio Himalay.
Trichilia undulatifolia.

54. Menispermaceae.

Cocculus laurifolius DC. India orient. Japonia.

55. Myristicaceae.

Myristica grandifolia A. DC. Insula Fiji.

56. Myrsineae.

Ardisia crenata Roxb. China.
— Olivieri Mast. Costa Rica.
Clavija cauliflora Rgl. America trop.
— ornata Don. America trop.
— Riedeliana Rgl. Brasilia.
Maesa argentea Wall. Regio Himalay.
Myrsine africana L. Regio Himalay, Africa austr. et tropica, Insul. Azores.

57. Myrtaceae.

Callistemon phoeniceus Lindl. Australia.
— salignus Sweet. var. angustifolia. Australia.
— rigidus R. Br. Australia.
Eucalyptus amygdalina Labill. Austr.
— globulus Labill. Australia.
— Gunni Hook. fil. Australia.
— leucoxylon F. Müll. Australia.
Eugenia apiculata DC. Chili.
Jambosa australis DC. [=Eugenia myrtifolia Sims.] Australia.
Leptospermum laevigatum F. Müll. Australia.
— scoparium Forst. var. acicularis. Australia.
Melaleuca acuminata F. Müll. Austr.
— albiflora Raensch. Australia.
— diosmaefolia R. Br. Austr.
— ericifolia Sm. Australia.
— incana R. Br. Australia.
Metrosideros robusta A. Cunn. Nov. Zeland.
— semperflorens Lodd. [=Callistemon lanceolatus Sw.] Australia
Myrrhinium sarcopetalum Lem. Brasilia.
Myrtus communis L. Europa australis Oriens.

Myrtus communis var. latifolia hort. [=Myrtus italica Mill.].
— communis var. romana hort. [=Myrtus romana Hoffmgg].
Napoleona imperialis Beauv. Africa tropica.
Psidium chinense Lodd. China.
— Guajava Linn. America tropica.
Tristania conferta R. Br. Australia.

58. Nepenthaceae.

Nepenthes Chelsoni h. Veitch. pl. hybr.?
— coccinea hort.
— Dominii hort. Veitch. pl. hybr.
— distillatoria L. Zeylan.
— Hookeri Alph. [=Nepentes Rafflesiana Jacq.] India orient.
Henryana hort.
— hybrida h. Veitch. pl. hybrida.
— Lawrenciana hort. pl. hybr.
— phyllamphora Willd. Insulae Molucc., Cochinchina.
— Rafflesiana Jacq. India orientalis.
— Sedenii hort. pl. hybr.
— Spicerianum pl. hybrida.

59. Nyctagineae.

Bongainvillaea glabra Choisy. Brasilia.
— spectabilis Willd. var. elegantissima. Brasilia.
Mirabilis Jalapa L. Peru.
Oxybaphus aggregatus Vahl. Mexico.
Pisonia subcordata Sw. India occident.

60. Nymphaeaceae.

Cabomba caroliniana A. Gr. America bor.
— caroliniana var. rubra. America bor.
Nymphaea alba L. Regio borealis temp.
— chromotella pl. hybr.
— stellata Willd. Asia et Africa tropica.
Nymphaea urceolata Hentze [=Nymph. alb. var.].
— zanzibarensis Casp. Africa trop.

61. Ochnaceae.

Gomphia gigantophylla Erh. [=Wolkensteinia Theophrasta Rgl.] Brasilia.

62. Olacineae.

Villaresia grandiflora Fisch. Brasilia.

63. Oleaceae.

Fraxinus mandshurica Rupr. Mandshuria.
— obovata Bl. [= Fraxinus Bungeana A. DC.] China.
— Ornus L. Regio Mediterr., Oriens.
— oxyphylla M. Bieb. [= Frax. oxycarpa Willd.] Europa austr. Oriens.
— sogdiana Bge. Turkestania.
Jasminum azoricum L. Ins. Fortunat.
— odoratissimum L. Insula Fortunat.
— Sambac Ait. Asia tropica.
Ligustrum longifolium?
— lucidum Ait. [= Ligustrum japonicum horti.]. China, Japonia.
— ovalifolium Hassk. Japonia.
Olea aquifolium Sieb. et Zucc. [= Osmanthus aquifolium Sieb.] Japonia.
— aquifolium var. fol. varieg. Japonia.
— — var. multidentata.
— cornuta Lindl. China.
— europaea L. Regio Mediterranea, Oriens.
— europaea var. rustica hort.
— — var. sativa hort.
— fragrans Thunb. China.
— undulata Jacq. [= Olea laurifolia Lam.] Africa australis.
Syringa chinensis Willd. Europa, Asia media.

64. Onograrieae.

Fuchsia coccinea Ait. var. divers. Chili.
— corymbiflora Ruiz. et Pav. Peru.
— fulgens Moc. Mexico.
— gracilis Moc. et Sesse [= Fuchsia microphylla H. B. Kth.] Mexico.
— gracilis Lindl. var. foliis varieg. Peru, Mexico.
— hybrida hort. var. divers.
— procumbens A. Cun. Nova Hollandia.
— triphylla L. Mexico.
Jussiaea grandiflora Mchx. Georgia, Carolina.

65. Oxalideae.

Oxalis Andrieuxii
— carnosa Mol. Chili.
— esculenta.
— tetraphylla Cav. Mexico.

66. Passifloreae.

Passiflora coerulea L. Brasilia.

67. Phytolacceae.

Ledenbergia roseo-aenea Lem. Brasilia.
Petiveria hexaglochin Fisch. et Mey. America austr.
Rivina aurantiaca Warsz. Amer. austr.
— humilis L, America tropica.
Seguiera americana L. America austr.

68. Piperaceae.

Artanthe elongata Mig. [= Piper angustifolium R. et Pav.] Brasilia.
Houttuynia cordata Thunb. Himalay, China, Japonia.
Peperomia cuneifolia A. Dietr. America tropica.
— emarginata Ruiz et Pav. Peru.
— Fenzli Rgl. Brasilia.
— incana A. Dietr. Brasilia.
— maculosa Hook. Ins. S. Domingo.
Peperomia magnoliaefolia A. Dietr. [= Peperom. tithymaloides A. Dietr.] America tropica.
— marmorata Hook. fil. Brasilia.
— polystachya Hook. India orient.
— resedaeflorae Lindl. & Andr. Nov. Granad.
— Verschaffeltii Lem. Brasilia.
Piper Betle L. [= Chavica Betle Miq.]. India orient., Malaya.
— Futokadsura Sieb. Japonia.
— nigrum L. Malaya.
— ornatnm N. E. Br. Ins. Celebes.
Saururus cernuus L. America borealis.

69. Pittosporeae.

Pittosporum bicolor Hook. Australia.
— erioloma C. Moore et F. Müll. Ins. Dom. Hove.
— revolutum Ait. Australia.
— tenuifolium Gärtn. Austr.
— Tobira Ait. China, Japonia.
— undulatum Vent. Australia.

70. Platanaceae.

Platanus occidentalis L. America bor.

71. Polemoniaceae.

Cobaea scandens Cav. Mexico.
Phlox acuminata Pursh. var. fol. aureo-var. America bor.

72. Polygoneae.

Coccoloba excoriata L. India occident.
Muehlenbeckia complexa Meissn. Nova Zelandia.
— platyclados Meissn. Ins. Salomon.
Polygonum baldschuanicum Rgl. Turkestania.

73. Portulaceae.

Anacampseros filamentosa Sims. Africa austr.

74. Primulaceae.

Cyclamen persicum Mill. Asia min., Graecia.
Primula Auricula L. Europa.
— obconica Hance. China.
— sinensis Sabine. China.

75. Proteaceae.

Grevillea robusta A. Cunn. Australia.
Leucadendron argenteum R. Br. Africa australis.
Lomatia silaifolia R. Br. Nova Hollandia.
Rhopala [Roupala] aurea Linden. America australis.

76. Ranunculaceae.

Aquilegia chrysantha A. Gr. Neo-Mexico.
Anemone apennina L. Hispania.
— japonica Sieb. et Zucc. Japonia.
— nemorosa L. Europa.
— Pulsatilla L. [= Pulsatilla vulgaris Mill.] Europa.
Clematis coccinea Englm. [= Clematis viorna L.] Amer. bor.
— cylindrica Sims. America bor.
— Davidiana Dcne. [Clematis heracleaefolia DC.] China.
— hybrida hort. var. Aureliana.
— — var. Lord. Mays.
— Jackmanni hort. pl. hybr.
— mandshurica Rupr. Mandshuria.
Heleborus caucasicus R. Br. Caucasus.
— hybridus hort. pl. hybrida.
— niger L. Europa.
— purpureus Wadst. et Kit. [= Helleb. odorus W. et Kit.] Hungaria.
Paeonia albiflora Pall. [= P. chinensis hort.] China, Sibiria.
Ranunculus fluitans Lam. Europa.
Trollius europaeus L. Europa.
— — var. giganteus hort.

77. Rhamneae.

Collettia spinosa Lam. America austr.
Gouania domingensis L. India occid.
Hovenia dulcis Thunb. Regio Himalay, China, Japonia.
Pomaderris apetala Labill. Australia.
Rhamnus Alaternus L. var. argentea. Reg. Mediterr., Asia minor.

78. Rosaceae.

Amygdalus communis L. var. bucharica. Turkestania.
— spinosissima Bge. Turkestania.
Cotoneaster microphylla Wall. Regio Himalay.
— tomentosa Lindl. Germania austr.
Crataegus cuneifolia Borkh. [= Crataeg. tomentosa L.] America bor
— nigra Waldst. et Kit. Hungaria
— Oxycantha L. Europa, Asia temp.
— — var. fl. albo pleno.
— — var. fl. rubro pleno.
Kerria japonica DC. [= Corchorus japonicus Thunb. Japonia.
— var. fl. pl. hort. Japonia.
Prunus atropurpurea hort.
— cerasifera Ehrh. [= Pr. divaricata Ledb.] Oriens.
— Laurocerasus L. Oriens.
— lusitanica L. Europa australis.
Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc. Japonia.
Rosa cinnamomea L. Europa austr. America bor.
— semperflorens Curt. China.
— spec. ind. divers.
Rubus phoenicolasius Maxim. Japonia.
— reflexus Ker. Gawl. [= R. moluccanus L.] Reg. Himalay, Malaga.
— sorbifolius Maxim. Asia trop.

79. Rubiaceae.

Bouvardia elegans hort. v. Alfr. Neubert. Mexico.
Coffea arabica L. Arabia, Africa trop.

Coprosma Baueri Engl. Nova Zelandia et Ins. Norfolk.
Higginsia discolor Planch. Mexico.
Manettia bicolor Paxt. [= Manettia luteo-rubra Benth.]. Brasilia.
Nertera depressa Bnks. et Sol. America austr., Nova Zelandia. Inst. Trist. Acun.
Plectronia ventosa L. Africa australis.
Posoqueria grandiflora America trop.

80. Rutaceae.

Almeidea macropetala Fisch. Brasilia.
Choisya ternata Kunth. Mexico.
Citrus Aurantium L. Asia tropica.
— — var. Bigaradia Lois.
— — var. nobilis Lour.
— — var. Vanilla Lour.
— decumana L. Asia tropica.
— limonum Risso. Asia tropica.
— medica L. Asia tropica.
— — var. Cedrato Rafin.
— — var. Limetta Risso.
— myrtifolia Rap.
— trifoliata L. Japonia.
Diosma capitata L. Africa austr.
— ericoides L. Africa australis.
Feronia gabanensis Africa trop.
Glycosmis pleiogyna Corr. Ind. orient.?
Murraya exotica L. Asia et Australia tropica.
Skimmia japonica Thunb. Japonia.
Systemon Fischeri Rgl. Brasilia.
Zanthoxylon Bungei Planch. China.

81. Sapindaceae.

Staphylea colchica Stev. Caucasia.
— pinnata L. Europa austr.
Xanthoceras sorbifolia Bge. China.

82. Sapotaceae.

Achras Sapota L. Mexico.
Chrysophyllum glabrum Jacq. Insula Martinic.
Chrysophyllum Roxbourghii S. Don. Asia tropica.
Sapota Mülleri Lindl. Surinam.
Sideroxylon Mastichodendron Jacq. India occid.

83. Sarraceniaceae.

Darlingtonia californica Torr. California.
Sarracenia Drummondi Croom. America sept.
— purpurea L. America sept.
— flava L. America bor.
— variolaris Michx. America bor.

84. Saxifrageae.

Adamia versicolor. Forst. China.
Brexia madagascariensis Thouars. Madagascar.
— spinosa Lindl. Madagasc.
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. [=Deutzia scabra Thunb.] Japonia.
— purpurea hort.
Eriobotrya japonica Lindl. China, Japonia.
Hoteia japonica Morr. et Dcne. [=Astilbe japonica A. Gr.] Japonia.
Hydrangea hortensis Siebold. Asia orient.
— — var. fol. var.
Saxifraga Fortunei Hook. var. tricolor. China.
— sarmentosa L. [= Saxifr. stolonifera Jacq.] China, Japonia.

85. Scrophularineae.

Calceolaria pinnata L. Peru.
Hallerla lucida L. Africa austr. et trop.
Lophospermum scandens Don. Mexico.
Mimulus moschatus Dougl. America boreali-occidentalis.
Torenia asiatica L. Asia trop.
— Fourneri Linden. Cochinchina.

Veronica fruticulosa L. Europa, Groenland.
— salicifolia Forst. Nova Zelandia.

86. Simarubaceae.

Simaruba excelsa DC. Jamaica.
Ailanthus glandulosa Desf. China, Japonia.

87. Solanaceae.

Brunfelsia americana L. Jamaica.
Capsicum annuum L. var. divers. Regio trop.
Datura arborea L. America austr.
Franciscea eximia Scheidw. Brasilia.
— — var. undulata. Brasilia.
— Lindeniana Planch. Brasilia.
Habrothamnus Bondouxii.
— elegans Scheidw. [= Cestrum fasciculatum Miers. var.]. Mexico.
— elegans var. coccinea hort. Mexico.
— fasciculatus Brong. [= Cestrum fasciculatum Miers.]. Mexico.
Lycium barbarum L. Oriens.
— vulgare Dun. Geront. temp.
Petunia hybrida hort. var. fl. pl.
Physalis edulis Sims. Regio calidor.
— Francheti. Japonia.
Solandra grandiflora Sw. var. magnifica Jamaica.
— hirsuta Dun. [=Brugmansia sarmentosa hort. = Dahura sarmentosa Lam.]. Brasilia.
Solanum pseudo capsicum L. Madeira.

88. Sterculiaceae.

Adansonia digitata L. Africa tropica.
Brachychiton acerifolium F. Müll. [= Sterculia acerifolia R. Br.] Nova Hollandia.
Heritiera Fischeri Rgl. Brasilia.
Machernia glabrata Cav. Africa austr.
Sterculia diversifolia S. Don. [= Sterculia heterophylla Cun.] Australia.
— mexicanum. R. Br. Mexico.
Theobroma Cacao L. America tropica.

89. Ternstroemiaceae.

Camellia japonica L. var. diver. Japonia.
Thea Bohea L. [= Thea chinensis Sims.var. Bohea]. China, Japonia.
— viridis L. China.

90. Tiliaceae.

Sparmannia Africana L. Africa austr.

91. Umbelliferae.

Eryngium agavifolium Griseb. Reg. Argent.
— maritimum L. Europa, Asia min.

92. Urticaceae.

Artocarpus Cannoni hort. Bull. Ins. Socotr.
Boehmeria argentea Lindl. Mexico.
— candicans Hassk. Asia tropica.
— macrophylla D. Don. Regio Himalay.
— tenacissima Gaud. [=Boehmeria nivea Gaud]. Asia tropica.
Brosimum Alicastrum Sw. America tropica.
— microcarpum Schott. America trop.
— spurium Sw. Jamaica.
Broussonetia papyrifera Vent. Malaya. Insul. Pacific.
Cecropia peltata L. America tropica.
Dorstenia Barterii Bur. Africa tropica.
— Ceratosanthes Lodd. [=Dorstenia arifolia Lam.] Brasilia.
— Contrayerwa L. Peru.
— elata Gärtn. Brasilia.
Elatostema sessile Forst. Asia tropica.

Ficus australis Willd. [= Ficus rubiginosa Desf.]. Australia.
— Bennettii Seem. Ins. Fiji.
— elastica Roxb. Asia tropica.
— — var. fol. var.
— laurifolia hort. India occ.
— Parcelli Veitch. Insulae Pacific.
— pumila L. Japonia, China.
— repens Rottl. India orient.
— stipulata Thunb. [= Ficus pumila L.]. China, Japonia.
— sororia Knth. & Bouché.
— subpanduraeformis Miq. [= Ficus heterophylla L. fil.] Asia tropica.
— sycomorus L. Africa bor.
— Vogelii Miq. Africa trop.
Galactodendron utile H. B. Kth. [= Brosimum Galactodendron D. Don.] Guiana.
Laportea peltata Gaud. Malaya.
Morus alba L. Asia temp.
— nigra L. Asia temp.
— tatarica L. Asia temp.
Paratropia venulosa Wight & Arn. [= Heptapleurum venulosum Seem.] Asia et Austral. trop.
Pellionia pulchra N. E. Br. Cochinchina.
Pilea grandis Wedd. Jamaica.
Ulmus campestris L. var. laevis. Europa.
— turkestanica Rgl. Turkestania.
Urostigma Vogelii V. Houtte. Africa tropica.

93. Vaccinieae.

Vaccinium Oxycoccos L. [= Oxycoccos palustris Pers.]. Regio boreal.
— Vitis Idaea L. Regio bor.

94. Verbenaceae.

Clerodendron fragrans Vent. [= Volkameria japonica Thunb.]. India or., Japonia.
— inerme Gaertn. India or.
— Thompsonae Balf. Africa trop.
Lantana Camara L. America tropica.
Petraea volubilis L. var. erecta hort. America tropica.

95. Violarineae.

Anchietia salutaris St. Hil. Brasilia.
Viola altaica Pall. Sibiria.
— odorata L. Europa.

II. Monocotyledones.

96. Alismaceae.

Sagittaria alpina Willd. Davur. Sibir. bor.
— Montevidensis Cham. et Schl. Reg. Argent.
— natans Mchx. America bor.

97. Amaryllideae.

Agave americana L. America tropica.
— — var. fol. aur. var. America tropica.
Agave atrovirens Karw. Mexico.
— chloracantha Salm Dyck. Mexico.
— excelsa Jacobi. Mexico.
— filifera S.-Dyck. Mexico.
— Guedeneyri Houll. Mexico.
— lophanta Schid. Mexico.
— univittata Haw. Mexico.
— Verschaffelti Lem. & Jac. Mexico.
— Victoriae reginae Th. Moore. Mexico.
Amaryllis alba Forsk. [= Crinum album Herb.] Arabia.

Amaryllis Belladonna L. var. major hort. Africa austr.
— formosissima L. [=Sprekelia formosissima Herb.]. Mexico.
— hybrida hort.
— vittata Ait. [= Hippeastrum vittatum Herb.]. Peru.
Clivia Gardeni Hook. Africa austr.
— miniata Bosse. [=Imatophyllum miniatum Hook.]. Africa austr.
— nobilis Lindl. [=Imatophyllum Antonii Hook.]. Africa austr.
Curculigo recurvata Dryand. Australia, Asia trop.
— — var. fol. albo-lineatis.
Eucharis amazonica Linden. [=Eucharis grandiflora Planch. et Lind.]. Nova Granada.
Fourcroya (Furcraea) cubensis Haw. India occidentalis.
— gigantea Vent. [=Fourcr. foetida Haw.] America trop.
— pubescens Tod.
Galanthus Elwesi Baker. Oriens.
— nivalis L. Europa media et austr.
— plicatus Red. Tauria.
Hippeastrum aulicum Herb. Brasilia.
— vittatum Herb. [= Amaryllis vittata Ait.]. Peru.
Haemanthus nivalis hort. Africa austr.
— virescens Herb. [=Haemanthus albiflos Jacq.] Africa australis.
Leucojum aestivum L. Hungaria, Oriens.
— autumnale J. Gay. Portugalia, Africa bor.
— vernum L. Europa media et austr.
Narcissus canariensis Burb. Insulae Canariens.
— Jonquilla L. Europa austr.
— incomparabilis Mill. Hispania, Italia.
— poëticus L. Regio mediterranea.
— Pseudo-Narcissus L. Europa media et austr.
— Tazetta L. Regio Mediterranea.
Pancratium distichum Sims. [=Hymenocallis littoralis. Salisb.] America austr.

98. Aroideae.

Acorus gramineus Ait. China.
— — v. fol. varieg. China.
— pusillus Sieb. Japonia.
Aglaonema commutatum Schott. Indi orient.
— nitidum Kunth. Insulae M luccae.
Amorphophallus dubius Blume. Indi orient.
— Rivieri Dur. Cochinchina, J ponia.
Anthurium acaule Poepp. et Endl. Per
— Andreanum Lindl. var. carne hort. Columbia.
— araliaefolium Rgl. Nova Cal donia.
— augustinum C. Koch. Brasili
— Bakeri Hook. America centr.
— bellum Schott. Brasilia.
— cordifolium Kunth. Costa Ric
— Dechardi André. Amer. trop.
— digitatum G. Don. Peru.
— elegans Engl. Columbia.
— fissum C. Koch. Caracas.
— Hookeri Kunth. India occident
— imperiale Miq.
— leuconeuron Lem. America tro
— Luschnatianum Kunth. [=Antl Olfersianum Kunth. var.]. Br silia.
— lucidum Kunth. Brasilia.
— magnificum Linden. Columbi Nova Granada.
— Miquelianum C. Koch. Ameri tropica.
— Olfersianum Kunth. Brasilia.
— Prochaskianum h. Mackoy.
— pedato-radiatum Schott. Mexi
— regale Linden. var. hybridu hort. America trop.
— Scherzerianum Schott. Guat mala.
— triphyllum Brong. Bolivia.
— Warocqueanum Moore. Reg. C lumbia.
Ariopsis peltata Roxb. Regio Himala

Arum odorum Roxb. India orient.
Calla aethiopica L. Oriens.
Colocasia antiquorum Schott. Asia trop.
— odora Brongn. [=Alocasia odora C. Koch.]. India or., China.
Dieffenbachia amoena hort.
— Bausei Rgl. [= Dieffenb. picta Schott. var.]. Costa Rica.
— picta Schott. Brasilia.
— — f. nebulosa Schott. Brasilia.
— Seguine Schott. Brasilia.
Epipremum mirabile Schott. Java.
Homalonema aromatica Schott. Malaya.
— caerulescens Jungh. et Schott. Java.
Monstera Borsigiana C. Koch. pl. hybr.
— deliciosa Lieb. [= Philodendron pertusum Kunth. et Bouché.]. America tropica.
Nephthytis liberica N. E. Br. Africa tropica.
Philodendron aculeatum Schott. America tropica.
— acuminatum.
— corsinianum.
— eximium Schott. Brasilia.
— gloriosum E. Andr. Columbia.
— melanochrysum Lind. et. Andr. Nova Granada.
— pertusum Kunth. et Bouché [= Monstera deliciosa Liebm.]. America tropica.
— tanyphyllum Schott. [= Philod. sagittifolium Liebm.]. Mexico.
— sanguineum Rgl. Mexico.
— Sodiroi hort. Nova Granada.
— Selloum C. Koch. Brasilia.
— Wallisii Rgl. America tropica.
Pinellia tuberifera Ten. [=Atherurus ternatus Bl.]. Japonia.
Pothos aurea Linden. Insula Salomon.
— ventricosus Hoffmay. Brasilia.
Remusatia vivipara Schott. India or., Burma.
Sauromatum guttatum Schott. India orient. Java.
Scindapsus pictus Hassk. [=Pothos argyraeus hort.]. Malaya.
Spathiphyllum blandum Schott. China.
Syngonium Riedelianum Schott. Brasilia.
— gracile Schott. Brasilia.
Xanthosoma atrovirens Koch. & Bché. Venezuela.

99. Bromeliaceae.

Aechmea discolor Morr. America austr.
Ananas macrodonta E. Moore. Brasilia.
Billbergia Lietzei E. Moore. Brasilia.
— longifolia C. Koch. et Bouché [=Billb. thyrsoidea Mart.] Brasilia.
— nutans Wendl. Brasilia.
— viridiflora Wendl. Brasilia.
— Windi hort. Herrenh. pl. hybr.
— Zebrina Lindl. Brasilia.
Canistrum leopardinum hort. America trop.
Caraguata cardinalis E. André. Columbia.
Cryptanthus acaulis Beer. Brasilia.
— — var. rubra.
— bivittatus Rgl. America. trop.
— Morrenii Rgl. Brasilia.
— Zonatus Beer. Brasilia.
Dyckia princeps Len. Brasilia.
— sulphurea C. Koch. Reg. Argentin.
Hohenbergia strobilacea Schult. [= Acanthostachys strobilacea Lk. Kl. et Otto]. Brasilia.
Lamprococcus Weilbachii F. Dietr. America tropica.
Neumannia maidifolia Koch. [=Pitcairnia maidifolia Dcne]. Guatemala.
Nidularium denticulatum Rgl. Brasilia.
— Innocenti Lem. [=Karatas Innocenti Ant]. Brasilia.
— purpureum Beer. [= Karatas purpurea Ant.]. Brasilia.
— sarmentosum Rgl. Brasilia.

Nidularium Scheremetievi Rgl. [=Karatas Scheremetievi Ant.]. Brasilia.
Pitcairnia echinata Hook. Nova Granada.
— flavescens Bak. [=Pitc. xanthocalyx Mast.]. Brasilia.
— lepidota Rgl. [=Pitc. Andreana Lind.]. Venezuela, Nova Granada.
— nubigena Planch. Venezuela.
— ramosa Jacq. var. rubriflora [=Pitc. latifolia Sol.]. India occident.
— recurvata C. Koch. var. alutacea. Brasilia.
— zeifolia C. Koch. [=Pitc. maidifolia Dcne.]. Guatemala.
Tillandsia usneoides L. America bor. et austral.
Vriesea brachystachys Rgl. Brasilia.
— corallina Rgl. [=Tillandsia corallina C. Koch.]. Brasilia.
— Malzinei E. Moore. America trop.
— speciosa Hook. America tropica.

100. Commelinaceae.

Dichorisandra mosaica Lindl. Peru.
Tradescantia albiflora Kth. [=Tr. viridis et repens hort.]. Brasilia.
— discolor L' Herit. Rhoeo discolor Hance.]. America centr. Mexico.
— fuscata Ker. var. angustifolia. Brasilia.
— fuscata var. latifolia. Brasilia.
— regalis hort.
— zebrina hort. [=Zebrina pendula Schnizl.]. Mexico.
— zebrina var. fol. var.
— — var. fol. tricolor.
— virginica L. America sept.

101. Cyclanthaceae.

Carludovica atrovirens Wendl. America tropica.
— palmata Ruiz et Pav. America australis.
— plicata Kl. Nova Granada.

102. Cyperaceae.

Carex gracilis R. Br. var. fol. albolineatis. Australia.
— japonica Thunb. fol. var. Japonia.
— sylvatica Huds. Europa, Asia temp.
Cyperus alternifolius L. Madagascar.
— esculentus L. Cosmop. trop.
— Haspan L. [=Galilea juncea] Cosmop. trop.
— natalensis Hochst. Africa australis.
— Papyrus L. Sicilia, Syria, Africa tropica.
— vegetus Willd. Chili.
Isolepis gracilis Nees India or.

103. Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thunbg. Japonia.
— quinqueloba Thunbg. Japonia.
Testudinaria Elephantipes Salisb. Africa austr.

104. Gramineae.

Bambusa argenteo-striata Rgl. Japonia.
— aurea Sieb. Japonia.
— — var. striata. Japonia.
— gracilis hort. India orient.
— — var. fol. var.
— pygmaea Miq. Japonia.
— verticillata Willd. [= Gigantochloa verticillata Munro] Java.
Arundo Donax L. var. fol. var. Regio Mediterranea.
Arundinaria glaucescens P. Beauv. India orient.
Coix Lacryma Iobi L. var. aureo-zebrina. Asia tropica.
Oplismenus imbicillus R. et Schult. fol. var. [=Oplism. undulatifolius Beauv.]. Regio trop. et subtrop.
Oryza sativa L. Asia tropica.
— sativa var. aristata. Asia trop.
Panicum plicatum Lam. Regio tropica.
Poa gracilis Desf. var. fol. albo-varieg.

Saccharum officinarum L. America septentr.-australis.
Stenotaphrum americanum Schrank. [=Stenotaphr. glabrum Trin.] America trop.

105. Haemodoraceae.

Ophiopogon Jaburan Ker. Japonia.
— — fol. aureo-var. Japonia.
— Jaburan fol. albo-var. Japonia.
Sanseviera javanica Bl. Java.
— zeylanica Bl. [=Aletris hyacinthoides L.] Zeylon, Java.

106. Hydrocharideae.

Elodea canadensis Michx. [=Anacharis alsinastrum Bab.] America bor.
— densa Casp. Reg. Argentin.
Hydrocharis morsus-ranae L. Europa.
Trianaea bogotensis Karst. Columbia.
Vallisneria spiralis L. Cosmop. temp.

107. Irideae.

Crocus maesianus Ker. [=Croc. luteus Lam.. = Croc. aureus Sh. & Sm.]. Regio Mediterranea.
— sativus L. var. div. hort. Regio Mediterr.
— vernus All. Regio Mediterr.
Gladiolus gandavensis Van Houtte. var. hybrid. divers.
— Childsii pl. hybr.
Iris florentina L. Europa australis.
— pumila L. Europa, Asia borealis.
— — var. coerulea hort.
— — var. alba hort.
Libertia formosa R. Grah. Chili.
Marica coerulea Ker-Gawl. Brasilia.

108. Lemnaceae.

Lemna gibba L. Regio bor. et austr.
— minor L. Amphiger.
Lemna polyrhiza [= Spirodela polyrh. =Lemna major Griff.] Regio bor. & arctica.
— trisulca L. Regio bor. et arctica.

109. Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Her. Africa austr.
Aletris fragrans L. [= Dracaena fragrans Ker-Gawl] Africa tropica.
Aloë arborescens Mill. Africa austr.
— ciliaris Haw. Africa austr.
— echinata Willd. Africa austr.
— ferox Mill. Africa austr.
— grandidentata S. Dyck. Africa austr.
— Hanburiana Naud. [= Aloë striata Haw.]. Africa austr.
— longe-aristata Haw. Africa austr.
— mitriformis Mill. Africa austr.
— variegata L. [= Aloe punctata Haw.]. Africa austr.
Anthericum Mackoyanum Rgl.
— — var. fol. var.
Arthropodium cirrhatum R. Br. Nova Zelandia.
Asparagus comorensis hort. var. tenuissima. Africa austr.
— plumosus Baker. Africa austr.
— retrofractus L. Africa austr.
— scandens Thunbg. var. deflexus. Africa austr.
— Sprengelii Rgl. Africa austr.
Bowiea volubilis Harw. Africa austr.
Chionodoxa Luciliae Boiss. Asia minor.
Chlorophytum comosum Bak. [=Chloroph. Sternbergianum Steudl.. =Cordyline vivipara hort.]. Africa australis.
— comosum var. fol. var. Africa austr.
Colchicum autumnale L. Europa.
— vernum hort. [= Bulbocodium vernum L.]. Europa austr., Oriens.
Cordyline calocoma hort. [=Cordyline australis Hook. fil.]. Nova Zelandia.

Cordyline calocoma var. angustifolia.
— — var. latifolia.
— cannaefolia R. Br. [=Cordyline terminalis Kunth.]. Australia.
— Forsteri F. Müll. Nova Zeland.
— indivisa Steudl. Nova Zelandia.
— — var. angustifolia.
— — var. latifolia.
— nutans C. Koch. Nov. Zeland.
— stricta Endl. Nova Hollandia.
— Veitchi Rgl. Nova Zeland.

Crinum Moori Hook. Africa austr. Natal.

Dasylirion glaucophyllum Hook. Mexico.

Dracaena amabilis hort. pl. hybr.
— concinna Kunth. Madagascar.
— congesta Swet. [= Cordyline congesta Steudl.]. Austr.
— Draco L. Insula Canar.
— ensifolia Wall. [= Dr. angustifolia Roxb.] India or.
— ferrea L. Asia trop., Austr.
— fragrans Ker-Gawl. [= Aletris fragrans L. = Sanseviera fragrans Jacq.]. Africa trop.
— fragrans v. Lindeni hort.
— — v. Massangeana hort.
— Goldieana hort. Africa occid. trop.
— hybrida hort. pl. hybr.
— javanica Kunth. [= Dracaena elliptica Thunb.]. Asia trop.
— indivisa Forst. [= Cordyline indivisa Steudl.]. Nova Zelandia.
— — var. angustifolia.
— — var. latifolia.
— — — — f. major.
— — — — f. rosea.
— Kochiana Rgl. India or.
— latifolia Rgl. [= Dr. Hookeriana C. Koch.] Africa austr.
— marginata Lam. Madagascar.
— Mazeli hort.
— reflexa Lam. Ins. Madagascar.
— umbraculifera Jacq. Java. Mauritius.
— vallato-purpurea hort.

Erythronium dens canis L. Europa, Asia bor.
— — — var. alba.
— — — var. purpurea.
— — — var. rosea.
— — — var. violacea.

Eucomis punctata L'Herit. Africa austr.

Funkia ovata Sprengl. Japonia.
— — var. fol. varieg. Japonia.
— — var. fol. albo-marginatis.
— — var. typica.
— subcordata Sprengl. [=F. grandiflora S. et Zucc. = F. japonica hort.]. Japonia.

Gasteria pulchra Haw. Africa austr.
— verrucosa Mill. Africa austr.

Hyacinthns candicans Baker. [= Galtonia candicans Dcne.] Africa austr.
— orientalis L. Regio mediterrannea.
— orintalis var. albulus Jord. [=Hyac. Romaine blanche].

Lapageria rosea Ruiz. ei Pav. Chili.
Lilium auratum Lindl. Japonia.
— Harrisi Carr. [= Lilium longiflorum Thunb.]. Japonia.
— lancifolium Thunb. [= Lilium speciosum Thbg.]. Japonia.

Luzuriago radicans Ruiz. et Pav. Chili.
Muscari botryodes Mill. [= Hyacinthus botryodes L.] Europa, Oriens.
Phormium tenax. Forst. Nova Zelandia.
Pincinectetia tuberculata hort. [=Nolina recurvata Hemsl.]. Mexico.
Plectogyne variegata Lk. [= Plectogine japonica hort. Japonia. = Aspidistra elatior Morr et Dcne. Japonia.].
— variegata var. foliis albo lineatis hort. Japonia.
Puschkinia scilloides Adams. Caucas., Asia min.
Reineckea carnea Kunth. [= Sanseviera carnea Andr.] Japonia.
— carnea var. fol. var. Japonia.

Rohdea [Rhodea] japonica var. fol. var. [= Orontium japonicum Thunb.]. Japonia.

Ruscus aculeatus L. Europa austr.
— — forma angustifolia Europa austr.
— aculeatus forma latifolia Europa australis.
— Hypoglossum L. Europa austr.
— hypophyllum L. Regio Medit.

Scilla bifolia L. Hispania, Oriens.
— cernua Red. [= Scilla sibirica Andr.] Rossia austr. Bosnia, Serbia.

Smilax china?
— officinalis Kunth. America tropica.

Trillium grandiflorum Salisb. America bor.

Tulipa Gesneriana L. Europa austr. Asia media et minor.
— Gesneriana var. divers. hort.
— — var. Darwini hort.
— — var. turcica Voss, [=Papagei-Tulipa].
— suaveolens Rth. var. div. hort. Europa austr.

Tupistra squalida Gawl. [=Rhodea Tupistra Schult.] India orient. (Ambonia).

Yucca aloifolia L. [= Yucca elephantipes hort.]. Mexico, India occid.
— aloifolia var. quadricolor Bak.
— filamentosa L. Carolina, Virginia.
— recurva Hawl. [= Yucca gloriosa L.]. Georgia.
— tricolor Haw. Mexico.
— Whipplei Torr. California, Arizona.

110. Orchideae.

Acropera Loddigesii Lindl. [= Gongora galeata Reichb. fil.]. Mexico.

Aërides Warneri India orient. Bombay.

Bifrenaria Harrisoniana Lindl. Brasilia.

Brassia verrucosa Bah. v. gigantea hort. Mexico.

Catasetum macrocarpum Rich. Guiana.

Coelogyne cristata. Lindl. Regio Himalay.
— fimbriata Lindl. China, Nepaulia.
— flaccida Lindl. Nepaulia.
— hirsuta hort. Saharampur.

Cymbidium aloifolium Sw. India orient.
— chinense Willd. China.
— giganteum Wall. India orient.
— Mastersii Griff. Regio Himalay.

Cypripedium barbatum Lindl. Java, Mount Ofir.
— Harrisianum Rchb. f. pl. hybr.
— insigne Wall. Regio Himalay.
— longifolium Warsz. [=Selenipedium longifolium Reichb. fil.] America austr.
— Schroederae pl. hybrida [Cypr. caudatum × Sedenii].
— venustum Wall. Nepaulia.
— villosum Lindl. India orient.

Gomeza Fischeri Rgl. Brasilia.
— planifolia Klotzsch. Brasilia.

Dendrobium chrysanthum Wall. India orient.
— japonicum Lindl. Japonia.
— nobile Lindl. Regio Himalay, China.
— Pierardi Roxb. India orient.

Epidendrun cochleatum Lindl. America cent., India occident.
— spec.

Laelia anceps Lindl. Mexico.
— crispa Reichb. Brasilia.
— praestans Lindl. & Rchb. [=Laelia pumila Roxb.]. Brasilia.

Liparis pendula Lindl. [=Liparis longipes Lindl.]. Asia tropica, Ins. Pacific.

Lycaste Deppei Lindl. Mexico.

Masdevallia Benedicti Rchb. f. Nova Granada.
— Chimaera Reichb. fil. America austr.
— Lindenii Andr. [= Masdev. coccinea Lind.]. America tropica.

Maxillaria squalens Hook. [=Xylobium squalens Lindl.]. America tropica.
Odontoglossum Alexandrae Batem. [=Odontogl. crispum Lndl. var.]. Nova Granada.
— cordatum Lindl. Mexico.
— Rossii Lindl. Mexico.
Oncidium Forbesii Hook. Brasilia.
— incurvum Bak. Mexico.
— varicosum Lindl. var. Rogeri Reichb. fil. Brasilia.
Peristeria Barkeri Batem. Mexico.
Phajus grandifolius Lour. China, Austr.
— maculatus Lindl. China, Regio Himalay.
— Wallichii Lindl. Ind. orient., Burma, Jamaica.
Pholidota imbricata Lindl. India orient.
Physosiphon Loddigesii Lindl. Mexico.
Sarcanthus rostratus Lindl. China.
Stanhopea Devoniensis Lndl. Mexico.
— graveolens Lndl. Mexico.
— aculata Lndl. Mexico.
— — var. crocea Mexico.
— Ruckeri Lndl. Brasilia.
— tigrina Batem. Mexico, Xalappa.
— — var. superba Mexico.
Thunia Marschalliana Reihb. f. Moulmain.
Trichopilia tortilis Lndl. Mexico.
Vanda suavis Lndl. Java.
— tricolor Lindl. Java.
Zygopetalum Mackayi Hook. Brasilia.
— № 1. Rochel.

111. Palmae.

Acanthorhiza aculeata Wendl. [=Chamaerorops stauracantha Willd]. Mexico.
— Wallisii H. Wndl. America centr.
— Warczewizii H. Wendl. Panama.
Archontophoenix Cunninghami Wendl. et Dr. [= Seafortia elegans. Hook. Nova Hollandia.
Areca Baueri Hook. fil. [=Rhopalostylis Baueri Wndl. et Dr.]. Ins. Norfolk et Chatham.
Areca sapida Sol. [= Rhopalostylis sapida Wndl. et Dr.].
— Verschaffelti hort. [=Hyophorbe Verschaffelti H. Wendl.]. Ins. Mascar.
Arenga saccharifera Labill. Malaya.
Astrocaryum Murumura Mart. non. Astr. Murumura Wallace]. Brasilia.
Attalea spectabilis Mart. Brasilia.
Brahea edulis H. Wendl [=Erythea edulis Wats.]. California.
Calamus ciliaris Blume Malaya.
— marginatus Mart. Borneo.
Caryota furfuracea Bl. [=Caryota mitis Lour.]. Cochinchina.
— maxima Bl. Java.
— sobolifera Wall. [= Caryota mitis Lour.]. India or.
— urens L. Asia trop.
Ceroxylon niveum Kerch [= Diplothemium caudescens Mart]. Brasilia.
Chamaedorea elatior Mart. Mexico.
— elegans Mart. var. angustifolia. America centr.
— Ernesti Augusti H. Wendl. Mexico.
— gracilis Willd. America austr.
— graminifolia Wendl. Mexico.
— Karwinskyana H. Wendl. [=Chamaed. elatior Mart.]. Mexico.
— macrocarpa hort.?
— Martiana H. Wendl. Mexico.
— Sartorii Liebm. Mexico.
Chamaerops argentea hort. [= Cham. excelsa var.?].
— elegans hort. [= Cham. excelsa var.?].
— excelsa Thunb. [=Trachycarpus excelsa Wendl.]. China.
— Fortunei Hook. [=Trachycarpus Fortunei Wendl.]. China, Japonia.
— humilis L. Regio Mediterr. occid.
— macrocarpa Trin. [=Cham. humilis L. var.].
Chrysalidocarpus indica H. Wendl. [= Hyophorbe indica lutescens hort.]. Ins. Bourbon, Maurit.

Clinostigma Mooreanum F. Müll. [= Kentia Mooreana F. Müll.]. Australia.
Cocos australis Mart. Paraguay.
— Blumenaria hort.
— insignis Mart. [=Glaziova insignis hort.]. Brasilia.
— Romanzoffiana Cham. Brasilia.
— Weddelliana H. Wendl. [= Glaziova Martiana Glaz.]. Brasilia.
Daemonorops marginatus Bl. [=Calamus marginatus Mart.]. Borneo.
Diplothemium caudescens Mart. [=Ceroxylon niveum hort.]. Brasilia.
Dypsis madagascariensis Ins. Madagascar.
Euterpe acuminata H. Wend. hab.?
— edulis Mart. America tropica.
Geonoma binervis. H. Wendl. America tropica.
— gracilis Lind. et Andrz. [=Geonoma Riedeliana Wendl.]. America austr.
Glaziova insignis hort. [= Cocos insignis Mart.]. Brasilia.
— Martiana Glaz. [=Cocos Weddelliana Wendl.]. Brasilia.
Hedyscepe Canterburyana Wndl. et Dr. [= Kentia Canterburyana F. Müll.]. Lord Howes Island.
Howea Belmoreana Becc. [= Kentia Belmoreana. F. Müll.]. Lord Howes Island.
— Forsteriana Becc. [=Kentia Forteriana F. Müll.]. Lord. Howes Island.
Hydriastele Wendlandiana Wndl. et Dr. [=Kentia Wendlandiana F. Müll.]. Australia.
Hyophorbe indica Gaertn. (non. hort.) Insula Mascaren.
— Verschaffelti H. Wendl. [=Areca Vershaffelti hort.] Insula Mascar.
Kentia Belmoreana F. Müll. [vide: Howea Belmoreana].
— Canterburyana F. Müll. [vidi: Hedyscepe Canterburyana].
Kentia Forsteriana F. Müll. [vide: Howea Fosteriana].
— Lindeni h. Lind. [= Kentiopsis macarocarpa Brong] Nova Caledonia.
— Mac Arthuri
— Mooreana F. Müll. [vide: Clinostigma Mooreanum].
— Sanderiana h. Sand.
— Wendlandiana F. Müll. [vide: Hydriastele Wendlandiana].
Latania Verschaffeltii Lem. [=Latania aurea Dunc.]. Ins. Rodriguez.
Livistona australis Mart. [= Corypha australis R. Br.] Nova Hollandia.
— chinensis R. Br. [=Latania borbonica Lam.]. China, Japonia.
— Hoogendorpii Teysm. Java.
— olivaeformis Mart. Java.
— rotundifolia Mart. Java.
Martinezia disticha Lind. Nova Granada.
Oreodoxa acuminata Willd. [=Euterpe acuminata H. Wendl.] hab.?
Phoenix canariensis hort. [=Phoenix Jubae Web. = Phoenix dactylifera L. var. canariensis]. Insula Canariensis.
— cycadifolia hort. [= Phoenix dactylifera var.].
— dactylifera L. Africa borealis, Arabia.
— farinifera Roxb. India orientalis.
— Jubae Webb. [=Ph. canariensis hort.] Ins. Canar.
— leonensis Lodd. [= Ph. reclinata var.]. Sierra Leone.
— melanosperma hort.
— reclinata Jacq. Africa trop. et austr.
— spinosa Schum. et Thon. [=Ph. reclinata var.].
— Senegalensis van Houtte [=Ph. reclinata var.].
— sylvestris Roxb. Ind. orientalis.
— tenuis Versch. [=Phoenix canariensis var.?]
— zanzibarensis hort.

Pritschardia filifera Linden. America bor. occid.
— macrocarpa Linden. Ins. Sandvic.
— robusta hort. [= Washingtonia robusta Wendl.]. California.

Raphia vinifera Beauv. Africa tropica.

Rhapis flabelliformis L. China, Japonia.
— — var. fol. albo-lineatis. China, Japonia.
— humilis Bl. China.

Rhopalostylis sapida Wendl. et Dr. [=Areca sapida Sol.]. Nova Zelandia.

Sabal havanensis Lodd. Cuba.
— mauritiiforme Gr. et Wndl. [=Trithrinax mauritiaef. Korsh.]. Ins. Trinidad. Mexico.
— mexicanum Mart. Mexico.
— Palmeto Lodd. Carolina, Florida.
— umbraculiferum Mart. India occidentalis.
— punctatum?

Thrinax Martiana Wendl. India occit.

Trachycarpus Fortunei Wendl. [=Chamaerops Fortunei hort.]. China. Japonia.
— excelsa Wendl. [=Chamaerops excelsa Thnbg.]. China

Trithrinax brasiliensis Mart. [=Trithrinax Chuco h. Linden.] Brasilia.
— mauritiaeformis Karst. [vide: Sabal mauritiiformis].

Washingtonia robusta Wendl. [=Pritchardia robusta hort.]. California.

112. Pandaneae.

Pandanus furcatus Roxb. India orient.
— graminifolius Kurz. Burma.
— javanicus hort. var. fol. varieg. [=Pand. Candelabrum Beauv.?]. Africa trop.
— Lais Kurz. Insulae Moluccae.
— nitidus Kurz. [= Pand. stenophyllus Kurz.?]. Java.
— utilis Borg. Madagascar.
— Veitchii Lam. Polynesia.

113. Pontederiaceae.

Heteranthera zosteraefolia Mart. Brasilia.

114. Scitamineae [Musaceae et Zingiberaceae].

Alpina nutans Bor. [=Renealmia nutans And.]. India orient.

Amomum Afzelii Roxb. India orient.

Calathea Bachmanniana h. Makoy. America trop.
— Lietzei Th. Moore. Brasilia.
— Leopoldii hort. America trop.
— sanguinea hort.
— undulata Rgl. Brasilia.
— Zebrina Linden. Brasilia.

Canna Crozy pl. hybr.
— indica L. India orient.
— — var. form. hort.: Admiratias. Alemania (178).
— indica var. form. hort.: Alphonse Bouvier.
— indica var. form. hort.: Alfred Dumesine.
— indica var. form. hort.: Aurea.
— — — — — Austria (169).
— indica var. form. hort.: Bonettii.
— — — — — comte de Choisine.
— indica var. form. hort.: Egenthale.
— — — — — Foulgier.
— — — — — Gigantea.
— — — — — Italia (170).
— — — — — Kronos (188).
— indica var. form. hort.: Mad. Sallier.
— indica var. form. hort.: Musaefolia.
— indica var. form. hort.: Parthenope (180).
— indica var. form. hort.: Phoebe (209).
— indica var. form. hort.: Reichskanzler Hohenlohe.
— indica var. form. hort.: Rendatleri.

Canna indica var. form. hort.: Rendatleri rubra.
— indica var. form. hort.: Souvenir.
— — — — — Suecia(181).
— ornata Koern. America trop.
Curcuma longa L. Asia tropica.
Globba Schomburgkii Hook. f. Siam.
Hedychium acuminatum Rosc. [= Hedych. spicatum Sm.]. Regio Himalay.
— Gardenerianum Wall. India orientalis.
Kaempferia rotunda L. Asia tropica.
Maranta arundinacea L. America austr.
— bicolor Ker. [=Calathea bicolor hort.]. Brasilia.
— compressa A. Dietr. America tropica.
— Kerchoveana E. Moore [= Maranta leuconeura E. Moore]. Brasilia.
Maranta ornata regalis. [= Calathea ornata Koern.]. America trop.
— setosa A. Dietr. Brasilia.
— - var. angustifolia. Brasilia.
Musa Cavendishii Lamb. [=Musa chinensis Sweet.]. China.
— Ensete Gmel. Africa tropica.
Phrynium cylindricum Rox. [=Calathea grandifolia Lindl.]. Brasilia.
— Lubbersii var. fol. var. [=Phrynium oblongifolium Rgl.] Brasilia.
Ravenala madagascariensis J. F. Gmel. Ins. Madagascar.
Strelitzia angusta Thunb. Africa australis.
— Nicolai Rgl. et Körn. Africa australis.
— Reginae Ait. Africa australis.
Zingiber officinale Rosc. [= Amomum Zingiber L.]. India orient.
— Zerumbet Rosc. Asia tropica.

III. Gymnospermae.

115. Coniferae.

Abies excelsa DC. [vide: Picea excelsa Lam.].
— firma Sieb. et Zucc. Japonia.
— Fraseri Lindl. America bor.
— Glehni F. Schmidt [vidi: Picea Glehni Mast.].
— nobilis Lindl. America bor. ocid.
— — var. glauca America bor. occid.
— Nordmanniana Spach. Regio Caucasica.
— sachalinensis Mast. Asia orient.
— sibirica Ledb. Ural, Sibiria.
— Webbiana Lindl. Reg. Himalay.
Araucaria Bidwillii Hook. Australia.
— brasiliensis A. Rich. Brasilia.
— Cunninghami Sweet. Australia.
— excelsa R. Br. Australia. Insula Norfolk.
Araucaria excelsa var. glauca for. hort.
— imbricata Pav. Chili.
Biota orientalis Endl. var. nepalensis [=Thuja orientalis L. var.]. Nepal.
Cedrus atlantica pyramidalis [=Cedrus Libani var.]. Oriens.
— Deodora Loud. Nepaulia.
— Libani Barrel. Oriens, Affghan., Regio Himalay, Algeria.
Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc. Japonia.
— tardiva Sieb. et Zucc. [= Taxus brevifolia hort.]. Japonia.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl. America bor. occid.
— Lawsoniana var. argentea hort. var. pisifera Sieb. et Zucc. f. filifera [= Cupressus pisifera C. Koch.]. Japonia.

Cryptomeria japonica Don. Japonia.
Cupressus Belfordiana?
— elegans hort. [= Cupress. sempervirens v. elegans.].
— funebris Endl. China.
— glauca Lam. India or.
— Lawsoniana Andr. America bor. occid.
— macrocarpa Hartw. California.
— sempervirens L. Europa austr. Oriens.
— — var. pyramidalis Targ.
Dammara obtusa Lindl. Ins. N. Hebrid.
Ginkgo biloba L. [=Salisburya adiantifolia Sm.] Japonia.
Juniperus caesia Rgl. California.
— communis L. v. pyramidalis hort. Regio bor. temp et arctica.
— communis var. hibernica Lodd. Regio bor. temp. et arctica.
— oxycedrus L. Europa austr., Caucasus.
Larix dahurica Turcz. var. japonica Maxim. Japonia.
— occidentalis Nutt. America bor. occid.
— sibirica Ledb. Ural. Sibiria.
Libocedrus decurrens Torr. California.
Picea ajanensis Fisch. Japonia. Regio Amur.
— Engelmanni Engelm. America bor. occid.
— excelsa L. Europa.
— — var. pumila glauca hort.
— Glehnii Mast. Ins. Sachalin.
— nobilis Loud. [vide: Abies nobilis Lndl.]
— obovata Ledb. Europa or., Sibiria.
— orientalis Carr. Caucasus, Asia min.
— Pindrow Loud. [vide: Abies Webbiana Lindl.].
— pungens Engelm. America bor. occid.
— Schrenkiana Fisch. & Mey. [= Picea obovata Ledb.].
Pinus cembra L. Europa austr., Asia borealis.
— densiflora Sieb. et Zucc. Japonia.
— insignis Dougl. California.
— leucodermis Antoine [= Pinus Laricio Poir.]. Europa austr.
— montana Mill. [=Pinus Pumilio Haenke]. Europa austr.
— Pinea L. Regio Mediterr.
— sylvestris L. Europa, Asia bor.
Podocarpus chinensis Sweet. [= Pod. macrophylla D. Don.]. Japonia.
— spinulosa R. Br. var. pungens Australia.
Taxus baccata L. Regio bor. temp.
Taxodium distichum Rich. America bor.
Thuja nepalensis Lodd. China, Japonia.
— occidentalis L. America borealis. Sibiria.
— orientalis L. China, Japonia.
— plicata Don. America bor.
— Warreana Booth. America bor.
Thujopsis [=Thuya] dolabrata Sieb. et Zucc. Japonia.
— dolabrata var. fol. var. Japonia.
Wellingtonia gigantea Lindl. [=Sequoja gigantea Lindl. et Gord. = Washingtonia californica Winsl.] California.

116. Cycadeae.

Ceratozamia longifolia Miq. [Ceratoz. mexicana Brong.]. Mexico.
Cycas circinnalis L. Ins. Moluccae.
— cylindrica h. Booth. [vide: Macrozamia cylindrica C. Moore].
— Neocaledonica Linden. Nova Caledonia.
— revoluta Thunb. India or., China Japonia].
Dion edule Lindl. Mexico.
Encephalartos longifolia Lehm. Africa austr.
— villosa Lem. Africa austr.
Macrozamia cylindrica C. Moore. Australia.

Zamia Maypurensis hort. ??
— Skinneri Warsz. America centralis.

117. Gnetaceae.

Ephedra altissima Desf. Africa bor.

B. Cryptogamae foliosae.

IV. Vasculares.

118. Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Europa, Asia, America bor. Africa bor.
— hiemale L. Europa, Sibiria.
— serpioides.

119. Filices.

Adiantum Capillus Veneris L. Europa austr., Asia media, America septent., Africa bor.
— diaphanum Bl. Nova Hollandia.
— Farlayense Moore. America trop.
— formosum R. Br. Nova Hollandia.
— pedatum L. America septent.-occid.
— reniforme L. Ins. Canar., Madeira, Mascar.
— scutum.
— tenerum Sw. India occident., America austr.

Allosurus falcatus Knze. India or., Nova Hollandia.
— rotundifolius Knze. Nova Zealand.

Alsophila australis Sw. Nova Hollandia.
— elegans Mart. Brasilia.
— infesta Van Houtt.?

Aneimia Phyllitidis Sw. America trop.

Asplenium Brownii I. Sm. Nova Hollandia.
— esculentum glabrum Prsl.
— Filix-femina Bernh. [=Athyrium Fil.-fem. Roth.]. Europa, Asia, America sept.

Asplenium nidus L. Asia tropica, Nova Hollandia.
— normale Don. India orient.
— pubescens Mett. India orient. Japonia.
— rupestre.
— viviparum Prsl. Ins. Mauritius.

Aspidium aristatum Sw. var. [=Lastraea aristata variegata]. Asia trop., Australia.
— falcatum Sw. Japonia, China, Africa austr.
— proliferum R. Br. var. Wollastoni. Nova Hollandia.
— Sieboldi Mett. Japonia.
— violascens Lk. Africa austral.

Balantium antarticum R. Br. Terra van Diemens.

Blechnum brasiliense Desv. Brasilia, Peru.
— hastatum Kaulf. var. minor. Amer. trop.
— Patersoni Mett. Nova Hollandia.

Cibotium princeps Lindl. [= Dicksonia princeps]. Polynesia, America centr.?

Davallia bullata Wall. China, Japonia, Ind. or.
— dissecta.
— Mariesi.
— pyxidata Cav. Australia.

Dicksonia squarrosa Sw. Nova Zelandia.

Didymochlaena lunulata Desv. India occid., Brasilia, Africa australis,

Doodia aspera R. Br. Nova Hollandia.
— caudata R. Br. Nova Hollandia.
Gymnogramme Calomelanos Kaulfs. America tropica.
— chrysophylla Kaulfs. America tropica.
— ferruginea Knze. Peru.
— japonica Thunb. Japonia.
— tartarea Desv. America tropica.
Heteroneuron repandum Fée. Asia centr., India orient.
Hymenophyllum nitens. R. Br. Nova Hollandia, Nova Zelandia.
Nephrolepis neglecta.
— plumosa.
Phegopteris divergens Fée. Antillae.
Platycerium alcicorne Desv. Australia tropica.
— Ellisii Bak. Madagascar?
— grande J. Sm. Arch. Malay et Austr. septent.
Polypodium areolatum H. B. Kth. America tropica.
— aureum L. America tropica.
— crassifolium L. America tropica.
— decurrens Raddi. Brasilia.
— irioides Poiret. China, Nova Hollandia.
— leiorhizon Wall. India orient.
— nervifolium Schkuhr. America austr.
— repens L. America austr.
— vulgare L. Europa, Asia, Africa austr. America sept.
Pteris cretica L. Cosmopol. subtrop.
— — albo-lineata L. Europa, Asia.
— nemoralis h. Schenk. hab.?
— quadriaurita Retz. var. argyrea. Regio subtrop.
— serrulata L. fil. China, Japonia.
— — var. cristata.
— stenophylla Hook. India orientalis.
Scolopendrium vulgare Sm. [= Asplenium Scolopendrium L.]. Europa media, Oriens; Japonia.
Todea barbara Moore. Australia, Africa austr.
Trichomanes radicans Hook. Cosmop. temp.
Woodwardsia radicans Sw. Regio subtropica.

120. Isoëteae.

Isoëtes echinospora Dur. Europa, Asia bor.
— hystrix.
— lacustris Dur. Europa.
— Malinverniana Cesit-De-Not. Nova Hollandia.
— setacea Bosk.

121. Lycopodiaceae.

Selaginella apus Spring. [= Lycopodium apodum L.]. America.
— africana.
— Brownii Spring. America trop.
— caesia?
— cuspidata Spring. Guatemala.
— involvens Spring. Columbia.
— Krausseana A. Br. [=Sel. denticulata hort.]. Insul. Azores.
— Martensi Spring. var. normalis [=Sel. stolonifera hort.] America tropica.

122. Marsiliaceae.

Marsilia macropus Eng.
— quadrifolia L. Europa, Asia media., America septentr.

123. Salviniaceae.

Azolla caroliniana Willd. Carolina.
Salvinia natans L. Europa media et austr., Asia, America septentr.
— orbiculata. America austr.

V. Cellulares.

124. Bryophytae.

Aitonia rupestris Forst.
Aneura pinguis Nees. Europa, America.
Blasia pusilla Mich. Europa, America bor.
Corsinia marchantioides Radd.
Fegatella conica Corda. Europa, America bor.
Fontinalis antipyretica L. Europa, America.
— gracilis Lindl. Europa.
Funaria hygrometica Hedw. Europa.
Hypnum spec.
Jungermannia spec.
Marchantia polymorpha L. Cosmopolit.
Mnium spec.
Pellia calycina Nees. Europa.
Plagiochasma crenulatum Ldg. et Nees.
Polytrichum spec.
Reboulia hemisphaerica Radd. Cosmopolit.
Riccia canaliculata.
— fluitans L. Europa, America bor., Brasilia, India orient., Africa aust.
— natans L. Europa, America bor., Brasilia.
Sphagnum spec.

Index alphabeticus Generum.

(Цифры обозначаютъ № семействъ).

Abies. 115.
Abrus. 46.
Abutilon. 51.
Acacia. 46.
Acalypha. 36.
Acanthorhiza. 111.
Acanthostachys. 99.
Acer. 2.
Achimenes. 40.
Achras. 82.
Achyranthes. 3.
Acorus. 98.
Acropera. 110.
Adamia. 84.
Adansonia. 88.
Adhatoda. 1.
Adiantum. 119.
Aechmea. 99.
Aerides. 110.
Agapanthus. 109.
Agave. 97.
Aglaonema. 98.
Ailanthus. 86.
Aitonia. 124.
Albizzia. 46.
Aletris. 105. 109.
Allamanda 7.
Allosurus. 119.
Almeidea 80.
Alocasia. 98.
Aloë. 109.
Alpinia. 114.
Alsophila. 119.
Alternanthera. 3.
Amaryllis. 97.
Amicia. 46.
Amomum. 114.
Amorphophallus. 98.
Amphiblemma. 52.
Amphitecna. 13.
Amygdalus. 78.
Anacampseros. 73.
Anacharis. 106.
Ananas. 99.
Anchietia. 95.
Andromeda. 35.
Aneimia. 119.
Anemone. 76.
Aneura. 124.
Anhalonium. 16.
Anona. 6.
Anthemis. 26.
Anthericum. 109.
Anthurium. 98.
Antidesma. 36.
Aphelandra. 1.
Aquilegia. 76.
Aralia. 8.
Araucaria. 115.
Archontophoenix. 111.
Ardisia. 56.
Areca. 111.
Arenga. 111.
Ariopsis. 98.
Aristolochia. 9.
Artanthe. 68.
Artocarpus. 92.
Arthropodium. 109.
Arum. 98.
Arundinaria. 104.
Arundo. 104.
Asclepias. 10.
Asparagus. 109.
Aspidistra. 109.
Aspidium. 119.
Asplenium. 119.
Aster. 26.
Astilbe. 84.
Astrocaryum. 111.
Astrophytum. 16.
Atherurus. 98.
Athyrium. 119.
Attalea. 111.
Aucuba. 27.
Azalea. 35.
Azolla. 123.

Balantium. 119.
Bambusa. 104.
Bauhinia. 46.
Begonia. 11.
Beloperone. 1.
Berberis. 12.
Bertolonia. 52.
Bifrenaria. 110.
Bignonia. 13.
Billbergia. 99.
Biophytym. 39.
Biota. 115.
Bixa. 14.
Blasia. 124.
Blechnum. 119.
Bochmeria. 92.
Boucerosia. 10.
Bougainvillaea. 59.

Boussingaultia. 23.
Bouvardia. 79.
Bowiea. 109.
Brachychiton. 88.
Brachyglottis. 26.
Brahea 111.
Brassia. 110.
Brexia. 84.
Brosimum. 92.
Broussonetia. 92.
Brugmansia. 87.
Brunfelsia. 87.
Bulbocodium. 109.
Butoa. 46.
Buxus. 36.

Cabomba. 60.
Cactus-Dahlia. 26.
Caesalpinia. 46.
Calampelis. 13.
Calamus. 111.
Calathea. 114.
Calceolaria. 85.
Calla. 98.
Callistemon. 57.
Camellia. 89.
Camphora. 45.
Candollea. 17.
Canistrum. 99.
Canna. 114.
Capparis. 18.
Capsicum. 87.
Caragana. 46.
Caraguata. 99.
Carex. 102.
Carludovica. 101.
Carmichaelia. 46.
Caryodaphne. 45.
Caryota. 111.
Cassandra. 35.
Cassia. 46.
Casuarina. 20.
Catalpa. 13.
Catasetum. 110.
Cecropia. 92.
Cedrela. 53.
Cedrus. 115.
Celastrus. 21.
Centradenia. 52.
Centrosema. 46.
Cephalotaxus. 115.
Ceratonia. 46.
Ceratophyllum. 22.
Ceratozamia. 116.
Cereus. 16.
Ceropegia. 10.
Ceroxylon. 111.
Cestrum. 87.
Chamaecyparis. 115.
Chamaedorea. 111.
Chamaerops. 111.
Chionodoxa. 109.
Chloranthus. 24.
Chlorophytum. 109.
Choisya. 80.
Chrysalidocarpus. 111.
Chrysanthemum. 26.
Chrysophyllum. 82.
Cibotium. 119.
Cineraria. 26.
Cinnamomum. 45.
Cissus. 4.
Citrus. 80.
Clavija 56.
Clematis. 76.
Clerodendron. 94.
Clethra. 35.
Clinostigma. 111.
Clivia. 97.
Cobaea. 71
Coccoloba. 72.
Cocculus. 54.
Cocos. 111.
Codiaeum. 36.
Coelogyne. 110.
Coffea. 79.
Coix. 104.
Colchicum. 109.
Colea. 13.
Coleus. 44.
Collettia. 77.
Colocasia. 98.
Combretum. 25.
Coprosma. 79.
Corchorus. 78.
Cordyline. 109.
Cornus. 27.
Corsinia. 124.
Corydalis. 38.
Corypha. 111.
Cotoneaster. 78.
Cotyledon. 28.
Coulteria. 46.
Crassula. 28.
Crataegus. 78.
Crescentia. 13.
Crinum. 109.
Crocus. 107.
Croton. 36.
Cryptanthns. 99.
Cryptocarya. 45.
Cryptolepis. 10.
Cryptomeria. 115.
Cupressus. 115.
Curatella. 31.
Curculigo. 97.
Curcuma. 114.
Cussonia. 8.
Cyanophyllum. 52.
Cycas. 116.
Cyclamen. 74.
Cymbidium. 110.
Cyperus. 102.
Cypripedium. 110.
Cyrtanthera. 1.
Cyrtodeira. 40.
Cytisus. 46.

Daemonorops. 111.
Dalechampsia. 36.
Dammara. 115.
Dahlia. 26.
Darlingtonia. 83.
Dasylirion. 109.
Datura. 87.
Davallia. 119.
Deeringia. 3
Dendrobium. 110.
Desmodium. 46.
Deutzia. 84.
Dicentra. 38.
Dichorisandra. 100.
Dicksonia. 119.
Diclytra. 38.

Didymochlaena. 119.
Didymopanax. 8.
Dieffenbachia 98.
Diervilla. 19.
Dion. 116.
Dionaea. 32.
Diosma. 80.
Dioscorea. 103.
Diplothemium. 111.
Doodia. 119.
Dorstenia. 92.
Dracaena. 109.
Drimys. 49.
Drosera. 32.
Dyckia. 99.
Dypsis. 111.

Eccremocarpus. 13.
Echeveria. 28.
Echinocactus. 16.
Echinocereus. 16.
Echinopsis. 16.
Echites. 7.
Edwardsia. 46.
Elaeagnus. 34.
Elaeodendron. 21.
Elodea. 106.
Elatostema. 92.
Encephalartos. 116.
Ephedra. 117.
Epidendron. 110.
Epimedium. 12.
Epiphyllum. 16.
Epipremum. 98.
Episciafulgida. 40.
Equisetum. 118.
Eranthemum. 1.
Erica. 35.
Eriobotrya. 84.
Eryngium. 91.
Erythea. 111.
Erythrina. 46.
Erythronium. 109.
Erythroxylon. 47.
Eucalyptus. 57.
Eucharis. 97.
Euclea. 33.
Eucomis. 109.
Eugenia. 57.
Eupatorium. 26.
Euphorbia. 36.
Eupomatia. 6.
Euterpe. 111.
Evonymus. 21.

Fagus. 30.
Fatsia. 8.
Fegatella. 124.
Feronia. 80.
Ficus. 92.
Fittonia. 1.
Fontinalis. 124.
Fourcroya. 97.
Franciscea. 87.
Fraxinus. 63.
Fuchsia. 64.
Funaria. 124.
Funkia. 109.

Galactodendron. 92.
Galanthus. 97.
Galilea. 102.
Galtonia. 109.
Gasteria. 109.
Gastonia. 8.
Genista. 46.
Geonoma. 111.
Georgina. 26.
Ginkgo. 115.
Gladiolus. 107.
Glaziova. 111.
Globba. 114.
Gloxinia. 40,
Glycine. 46.
Glycosmis. 80.
Gnaphalium. 26.
Goethea. 51.
Goldfussia. 1.
Gomeza. 110.
Gomphia. 61.
Gongora. 110.
Gossypium. 51.
Gouania. 77.
Grevillea. 75.
Griselinia. 27.
Gunnera. 41.
Gymnogramme. 119.

Habrothamnus. 87.
Haemanthus. 97.
Haematoxylon. 46.
Halleria. 85.
Hardenbergia. 46.
Hedera. 8.
Hedychium. 114.
Hedysarum. 46.
Hedyscepe. 111.
Helichrysum. 26.
Heliotropium. 15.
Helleborus. 76.
Heptapleurum. 92.
Heritiera. 88.
Heteranthera. 113.
Heteroneuron. 119.
Hevea. 36.
Hibiscus. 51.
Higginsia. 79.
Hippeastrum. 97.
Hohenbergia. 99.
Homalonema. 98.
Hoteia. 84.
Houttuynia. 68.
Hovenia. 77.
Howea. 111.
Hoya. 10.
Hura. 36.
Hyacinthus. 109.
Hydrangea. 84.
Hydriastele. 111.
Hydrocharis. 106.
Hymenaea. 46.
Hymenocallis. 97.
Hymenophyllum. 119.
Hyophorbe. 111.
Hypericum. 42.
Hypnum. 124.

Jacaranda. 13.
Jamobosa. 57.
Jasminum. 63.
Jatropha. 36.

Iberis. 29.
Ilex. 43.

ım. 49.
)phyllum. 97.
ıe. 3.
107.
es. 120.
pis. 102.
ermannia. 124.
)erus. 155.
aea. 64.

npferia. 114.
nchoë. 28.
ıtas. 99.
nedya. 46.
tia. 111.
ia. 78.
nia. 26.

lia. 110.
ıprococcus. 99.
ıtana. 94.
)ageria. 109.
)ortea. 92.
ix. 115.
straea. 119.
ania. 111.
thyrus. 46.
ırus. 45.
lenbergia. 67.
mna. 108.
ptospermum. 57.
ucadendron. 75.
ucojum. 97.
)ertia. 107.
)ocedrus. 115.
gustrum. 63.
ium. 109.
paris. 110.
riodendron. 49.
tsea. 45.
vistona. 111.
)belia. 48.
)matia. 75.
onicera. 19.
ophospermum. 85.
uzuriago. 109.
ycaste. 110.
ycium. 87.

Machaerium. 46.
Machernia. 88.
Macrozamia. 116.
Maesa. 56.
Magnolia. 49.
Malacocarpus. 16.
Malpighia. 50.
Mamillaria. 16.
Manettia. 79.
Manihot. 36.
Marica. 107.
Marsilia. 122.
Martinezia. 111.
Maranta. 114.
Marchantia. 124.
Masdevallia. 110.
Maxillaria. 110.
Medinilla. 52.
Melaleuca. 57.
Melia. 53.
Mesembryanthemum. 37.
Metrosideros. 57.
Michelia. 49.
Miconia. 52.
Mimosa. 46.
Mimulus. 85.
Mirabilis. 59.
Mnium. 124.
Monstera. 98.
Morus. 92.
Muehlenbeckia. 72.
Murraya. 80.
Musa. 114.
Muscari. 109.
Myriophyllum. 41.
Myristica. 55.
Myrrhinium. 57.
Myrsine. 56.
Myrtus. 57.

Nandina. 12.
Napoleona. 57.
Narcissus. 97.
Nepenthes. 58.
Nephrolepis. 119.
Nephthytis. 98.
Nerium. 7.
Nertera. 79.
Neumannia. 99.
Nidularium. 99.
Nolina. 109.
Nymphaea. 60.

Ocotea. 45.
Odontoglossum. 110.
Olea. 63.
Oncidium. 110.
Ophiopogon. 105.
Oplismenus. 104.
Opuntia. 16.
Oreodaphne. 45.
Oreodoxa. 111.
Orontium. 109.
Oryza. 104.
Oxalis. 65.
Oxybaphus. 59.

Paeonia. 76.
Pachysandra. 36.
Panax. 8.
Pancratium. 97.
Pandanus. 112.
Panicum. 104.
Paratropia. 92.
Parkinsonia. 46.
Passiflora. 66.
Pavonia. 51.
Peireskia. 16.
Pelargonium. 39.
Pellia. 124.
Pellionia. 92.
Peperomia. 68.
Pereskia. 16.
Peristeria. 110.
Petiveria. 67.
Petraea. 94.
Petunia. 87.
Phajus. 110.
Phegopteris. 119.
Philodendron. 98.
Phlox. 71.
Phoenix. 111.
Pholidota. 110.
Phormium. 109.
Phrynium. 114.

'hyllanthus. 36.
'hyllocactus. 16.
'hysalis. 87.
'hysosiphon. 110.
'icea. 115.
'ieris. 35.
'ilea. 92.
'ilocereus. 16.
'incinectetia. 109.
'inellia. 98.
'inus. 115.
'iper. 68.
'isonia. 59.
'istacia. 5.
'itcairnia. 99.
'ithecolobium. 46.
'ittosporum. 69.
'lagiochasma. 124.
'latanus. 70.
'latycerium. 119.
'latylobium. 46.
'lectogyne. 109.
'lectranthus. 44.
'lectronia. 79.
'leiogynium. 5.
'oa. 104.
'odocarpus. 115.
'ogostemon. 44.
'olygonum. 72.
'olypodium. 119.
'olytrichum. 124.
'omaderris. 77.
'osoqueria. 79.
'othos. 98.
'rimula. 74.
'ritchardia. 111.
'runus. 78.
'seudopanax. 8.
'sidium. 57.
'teris. 119.
'ueraria. 46.
'ulsatilla. 76.
'uschkinia. 109.
'yrethrum. 26.

)uercus. 30.

Ranunculus. 76.
Raphia. 111.
Raphiolepis. 78.
Ravenala. 114.
Reboulia. 124.
Reineckea. 109.
Remusatia. 98.
Renealmia. 114.
Rhamnus. 77.
Rhapis. 111.
Rhipsalis. 16.
Rhodea. 109.
Rhododendron. 35.
Rhopala. 75.
Rhopalostylis. 111.
Rhus. 5.
Riccia. 124.
Rivina. 67.
Robinia. 46.
Rochea. 28.
Rohdea. 109.
Royena. 33.
Rosa. 78.
Rosmarinus. 44.
Rubus. 78.
Ruellia. 1.
Ruscus. 109.

Sabal. 111.
Saccharum. 104.
Sagittaria. 96.
Saintpaulia. 40.
Salvia. 44.
Salvinia. 123.
Sambucus. 19.
Sanseviera. 105. 109.
Sapota. 82.
Sarcanthus. 110.
Sarracenia. 83.
Sauromatum. 98.
Saururus. 68.
Saxifraga. 84.
Schinus. 5.
Schubertia. 10.
Sciadocalyx. 40.
Scilla. 109.
Scindapsus. 98.
Scolopendrium. 119.
Scutellaria. 44.
Seafortia. 111.
Sebifera. 45.
Sedum. 28.
Seguiera. 67.
Selaginella. 121.
Selenipedium. 110.
Sempervivum. 28.
Senecio. 26.
Sequoja. 115.
Sideroxylon. 82.
Simaruba. 86.
Sinningia. 40.
Skimmia. 80.
Smilax. 109.
Solandra. 87.
Solanum. 87.
Sonerila. 52.
Sophora. 46.
Sparmannia. 90.
Spathiphyllum. 98.
Sphagnum. 124.
Spondias. 5.
Sprekelia 97.
Stanhopea. 110.
Stapelia. 10.
Stenotaphrum. 104.
Stephanophysum. 1.
Sterculia. 88.
Staphylea. 81.
Strelitzia. 114.
Strobilanthes. 1.
Strophanthus. 7.
Stylidium. 17.
Syngonium. 98.
Syringa. 63.
Systemon. 80.

Tabernaemontana. 7.
Taxodium. 115.
Taxus. 115.
Telanthera. 3.
Testudinaria. 103.
Tetranthera. 45.
Teucrium. 44.
Tillandsia. 99.
Thea. 89.
Theobroma. 88.
Thrinax. 111.

Ulex. 46.
Ulmus. 92.
Umbilicus. 28.
Unona. 6.
Urostigma. 92.

111.
OO.
Vaccinium. 93.
Vallisneria. 106.
Vanda. 110.
Veronica. 85.
Viburnum. 19.
119.
O.
Villaresia. 62.
Vinca. 7.
Viola. 95.
1.
Vitis. 4.
Volkameria. 92.
Vriesea. 99.

Washingtonia. 111.
Washingtonia. 115.
Weigelia. 19.
Wellingtonia. 115.
Westringia. 44.
Wistaria. 46.
Wolkensteinia. 61.
Woodwardsia. 119.

Xanthoceras. 81.
Xanthosoma. 98.
Xylobium. 110.
Xylophylla. 36.
Xylosteum. 19.

Yucca. 109.

Zamia. 116.
Zamioculcas. 98.
Zanthoxylon. 80.
Zebrina. 100.
Zingiber. 114.
Zygopetalum. 110.

Dr. Ch. Gobi,
horti director.

R. Niemann,
hortulanus primarius.

i. Nov. 1901.

Pamphlet Binders

are carried in stock in the following sizes

	HIGH	WIDE	THICKNESS
1525	9 inches	6 inches	½ inch
1526	9¾ "	7⅛ "	½ "
1527	10½ "	7⅜ "	¼ & ½ "
1530	12 "	9⅛ "	½ "

Other sizes are made to order

Libra[illegible]ureau

Library supplies of all kinds

9

3 2044